


RESEAU PIEZOMETRIQUE DE BRETAGNE CONVENTION MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - BRGM 2026 APPUI 2026 DU BRGM AUX SERVICES EN CHARGE DE LA POLICE DE L'EAU

Etat des nappes d'eau souterraine de la Bretagne à fin septembre 2026

*Des pluies déficitaires sur les sept derniers mois à l'échelle régionale,
des nappes souvent en baisse, des niveaux surtout très bas
par rapport aux moyennes des mois de septembre*

Le bulletin précédent, édité fin août 2026, a montré que la pluviométrie observée sur l'année hydrologique (septembre 2025 à août 2026) a été irrégulière mais globalement proche de la normale, que la recharge hivernale des nappes s'était déroulée au rythme des excédents et des déficits de pluie, et que leurs niveaux étaient surtout très bas par rapport aux moyennes des mois d'août. La période de vidange a commencé début mars 2026 puis elle s'est poursuivie jusqu'à fin août, malgré quelques faibles interruptions estivales. Le déficit de pluies constaté en juillet et août 2026 s'est poursuivi au mois de septembre : déficit pluviométrique global d'environ 67 % au niveau régional mais avec des hétérogénéités locales liées aux orages de fin septembre.

Durant la période de mars à septembre 2026, sur les quatre stations météorologiques mentionnées ci-après, les précipitations sont systématiquement inférieures aux normales : 75 % de la « normale » à la station de Rennes St-Jacques (35), 57 % à St-Brieuc Trémuson (22), 51 % à Pontivy (56) et 48 % à Spézet St-Goazec (29). Le constat est similaire en comparant les pluies efficaces à leurs normales.



Pluies exprimées en mm entre mars et septembre 2026 (données Météo-France).

*Normales de pluie calculées sur la période 1991-2020 pour Rennes et St-Brieuc
et sur 1981-2010 pour Pontivy et Spézet (Météo-France).*

Pluies efficaces (Peff) exprimées en mm (données BRGM).

Normales de pluie efficaces calculées sur la période 2006-2025 (BRGM).

Stations	Normales Pluie	Pluies	Normales Peff	Pluies efficaces
Rennes St-Jacques (35)	353.2	265.4	37.8	22.4
St-Brieuc Trémuson (22)	358.7	205.8	46.5	36.0
Pontivy (56)	440.0	224.1	48.1	11.2
Spézet St-Goazec (29)	513.0	247.0	83.7	1.6

Au droit des quatre stations météorologiques, les pluies efficaces (part de précipitations qui soit ruisselle à la surface du sol soit s'infiltre jusqu'à la nappe) calculées sur la période de mars à septembre 2026 ont été faibles ou quasi-absentes (8 % des pluies tombées à Rennes St-Jacques, 17 % à St-Brieuc Trémuson, 5 % à Pontivy et 1 % à Spézet St-Goazec). En effet, les pluies dites « d'été » alimentent peu les nappes puisqu'elles sont soit évaporées, soit utilisées par les plantes et la végétation. Cependant, en septembre, quelques petites pluies efficaces ont été observées localement vers les 8, 17 et 28-29 septembre.

La baisse des niveaux de nappe, amorcée depuis début mars 2026, s'est globalement poursuivie en septembre, avec quelques interruptions momentanées, mais la recharge pourrait peut-être commencer en octobre.

A titre d'exemple, 4 chroniques piézométriques mesurées en 2026 sont représentées en page 4 (source : BRGM Bretagne sur le site Internet ADES <https://ades.eaufrance.fr/>).

Evolution récente des niveaux de nappe

Au niveau de la carte régionale (cf. page suivante), les nappes de Bretagne présentent des niveaux souvent en baisse (63 % des piézomètres du réseau). Cette baisse des niveaux, observée dans les quatre départements et notamment dans le Finistère, est liée à des pluies efficaces absentes en septembre (cf. graphiques de Landudec, Bieuzy et Kerpert en page 4).

La carte montre également plusieurs niveaux de nappe stables (37 % des piézomètres), grâce aux petites pluies efficaces de fin septembre qui ont entraîné localement des recharges momentanées (séquences de baisse-hausse-baisse de niveau sur les 15 derniers jours du mois de septembre ; cf. graphique de Saint-Jacques-de-la-Lande en page 4).

Aucun niveau de nappe en hausse n'est recensé en septembre.

Niveaux des nappes par rapport aux moyennes des mois de septembre

La carte régionale (cf. page suivante) montre un état de remplissage des aquifères à fin septembre surtout très bas (42 % des piézomètres) par rapport aux moyennes des mois de septembre (comparaison par rapport aux mesures effectuées en septembre depuis le début du suivi ; cf. encart de la carte page suivante). Cette situation, observée essentiellement dans le Finistère et dans les Côtes d'Armor (cf. graphiques de Landudec et Kerpert en p. 4 et 5), s'explique par des pluies efficaces faibles ou quasi-absentes ces sept derniers mois (mars à septembre 2026), n'ayant pas permis de conserver les niveaux supérieurs ou conformes aux moyennes observés à fin mars 2026 (baisse quasi-continue des niveaux depuis début mars).


De nombreux piézomètres, visibles sur toute la région, présentent des niveaux bas (29 % des piézomètres ; cf. graphiques de Bieuzy en pages 4 et 5) et 23 % des piézomètres affichent des niveaux modérément bas, surtout à l'est de la Bretagne (cf. graphiques de Saint-Jacques-de-la-Lande en p. 4 et 5). Ces points sont situés dans des secteurs n'ayant quasiment pas bénéficié de recharge depuis mars.


Un piézomètre en Ille-et-Vilaine présente un niveau conforme aux moyennes des mois de septembre. Il semble lié à des pluies efficaces qui ont dû être localement suffisantes durant les 12 derniers mois.

On constate un niveau modérément haut ainsi qu'un niveau haut dans le Morbihan, dans des secteurs où les pluies efficaces de l'année hydrologique 2025-2026 ont permis une meilleure recharge des nappes.


Au cours des sept derniers mois, les pluies ont été déficitaires à l'échelle régionale. Les petites pluies efficaces de fin septembre ont parfois arrêté momentanément la baisse estivale des nappes, qui se poursuit sur une grande partie du territoire. Les niveaux, témoignant de l'état de remplissage des réserves souterraines, sont surtout très bas par rapport aux moyennes des mois de septembre et 94 % des niveaux des nappes de Bretagne sont en-dessous des « normales ».

A Rennes, le 5 octobre 2026







Niveau de nappe à Landudec (29) en 2026 (BSS000ZCUJ)
(altitude du repère de mesure du niveau de nappe : 121,65 m NGF)




Niveau de nappe à Bieuzy (56) en 2026 (BSS000ZJKX)
(altitude du repère de mesure : 160,14 m NGF)




Niveau de nappe à Kerpert (22) en 2026 (BSS000VLAJ)
(altitude du repère de mesure : 283,08 m NGF)




Niveau de nappe à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) en 2026 (BSS000XNZX)
(altitude du repère de mesure : 35,20 m NGF)




Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) à Landudec (29) en 2026 (BSS000ZCUJ)



IPS à Bleuzy (56) en 2026 (BSS000ZJKX)



IPS à Kerpert (22) en 2026 (BSS000VLAJ)



IPS à Saint-Jacques-de-la-Lande (35) en 2026 (BSS000XNZX)