RESEAU PIEZOMETRIQUE DE BRETAGNE
CONVENTION MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE - BRGM 2026
APPUI 2026 DU BRGM AUX SERVICES EN CHARGE DE LA POLICE DE L'EAU

Etat des nappes d'eau souterraine de la Bretagne à fin octobre 2026


Des pluies inférieures aux normales sur les 2 derniers mois,
des nappes majoritairement stables,
des niveaux surtout très bas par rapport aux moyennes d'octobre

Le bulletin précédent, édité fin septembre 2026, a montré que :

- les niveaux des nappes étaient surtout très bas par rapport aux moyennes des mois de septembre, suite à une pluviométrie inférieure à la normale durant les 7 derniers mois (mars à septembre 2026) ;
- la baisse du niveau des nappes, amorcée depuis début mars 2026, s'est globalement poursuivie en septembre, malgré quelques interruptions locales et momentanées.

La tendance peu pluvieuse des derniers mois s'est poursuivie en octobre : la pluviométrie a été déficitaire sur une grande partie de la région (déficit d'environ 20 % à l'échelle régionale), sauf dans le Finistère où elle a été légèrement excédentaire.

Durant la période de septembre à octobre 2026, sur les quatre stations météorologiques mentionnées ci-après, les précipitations sont inférieures aux normales : 47 % de la normale à la station de Pontivy (56), 59 % à St-Brieuc Trémuson (22), 63 % à Rennes St-Jacques (35) et 84 % à Spézet St-Goazec (29).
Les pluies efficaces sont absentes sur la même période, sauf à Spézet St-Goazec où elles sont légèrement inférieures aux normales.



Pluies exprimées en mm entre septembre et octobre 2026 (données Météo-France)
Normales de pluie calculées sur la période 1991-2020 pour Rennes et St-Brieuc et sur 1981-2010 pour Pontivy et Spézet (Météo-France)
Pluies efficaces (Peff) exprimées en mm (données BRGM)
Normales de pluie efficaces calculées sur la période 2006-2025 (BRGM)

Stations	Normales Pluie	Pluies	Normales Peff	Pluies efficaces
Rennes St-Jacques (35)	129.7	81.7	28.8	0.0
St-Brieuc Trémuson (22)	134.0	79.5	30.4	0.0
Pontivy (56)	178.0	83.2	46.6	0.0
Spézet St-Goazec (29)	203.0	171.3	56.7	51.1

Au droit des quatre stations météorologiques, les pluies efficaces (part de précipitations qui soit ruisselle à la surface du sol soit s'infiltre jusqu'à la nappe) calculées sur les 2 derniers mois (septembre et octobre 2026) ont été très faibles en septembre et un peu plus présentes en octobre (quelques pluies efficaces ont été observées localement les 7, 12, 19, 22, 23, 25 et 29 octobre). La baisse des niveaux de nappe, amorcée depuis début mars 2026, s'est globalement poursuivie jusqu'à fin septembre. La recharge des nappes, qui se fait grâce à ces pluies efficaces, semble avoir commencé localement au cours du mois d'octobre 2026, sans toutefois être généralisée.
A titre d'exemple, 4 chroniques piézométriques mesurées en 2026 sont représentées en page 4 (source : BRGM Bretagne sur le site Internet ADES https://ades.eaufrance.fr/).

Evolution récente des niveaux de nappe

Sur la carte régionale (cf. page suivante), les nappes de Bretagne présentent majoritairement un niveau stable (50 % des piézomètres du réseau). Cette stabilité, visible dans les 2/3 est de la région, s'observe dans les secteurs où les pluies efficaces ont permis d'interrompre la baisse des niveaux sans toutefois permettre une recharge durable des nappes (séquence de baisse-hausse-baisse de niveau sur les 15 derniers jours du mois - cf. graphiques de Trémeur et Missiriac en page 4).

La carte montre également de nombreux niveaux de nappe en hausse (33 % des piézomètres), notamment dans le Finistère. Cette hausse est liée aux pluies efficaces de la seconde quinzaine d'octobre, qui ont permis d'amorcer la recharge des nappes (cf. graphique de Saint-Ségal p. 4).

Plusieurs piézomètres affichent des niveaux encore en baisse (17 % des stations), principalement dans le Finistère et au sud de l'Ille-et-Vilaine. Ces points sont situés dans des secteurs où la recharge n'a pas encore commencé, en l'absence de pluies efficaces (cf. graphique de La Noë Blanche en p. 4).

Niveaux des nappes par rapport aux moyennes des mois d'octobre

A fin octobre, le remplissage des aquifères est surtout très bas (44 % des piézomètres) par rapport aux moyennes des mois d'octobre (comparaison par rapport aux mesures effectuées en octobre depuis le début du suivi ; cf. encart de la carte page suivante). Cette situation est observée sur toute la région, et particulièrement dans le Finistère et les Côtes d'Armor (cf. graphiques de Saint-Ségal et Trémeur en p. 4 et 5). Elle s'explique par des pluies efficaces faibles sur les 8 derniers mois (mars à octobre 2026), qui maintiennent depuis plusieurs mois des niveaux très inférieurs aux moyennes. De nombreux piézomètres, visibles dans toute la région, présentent des niveaux bas par rapport aux moyennes d'octobre (29 % des piézomètres - cf. graphique de Missiriac) et 21 % des stations affichent des niveaux modérément bas (cf. graphique de La Noë Blanche). Ces points présentent des niveaux inférieurs aux moyennes depuis plusieurs mois et les pluies efficaces d'octobre n'ont pas suffi à recharger les nappes.


Seuls deux piézomètres, en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, montrent des niveaux de nappe conformes aux moyennes des mois d'octobre, dans les secteurs où les pluies efficaces ont été suffisantes ces derniers mois.

Un seul piézomètre présente des niveaux modérément hauts par rapport aux moyennes d'octobre (Bignan), dans un secteur où les pluies efficaces de l'année hydrologique 2025-2026 ont permis une meilleure recharge des nappes.


Après la phase de baisse estivale, les nappes bretonnes sont majoritairement stables : les pluies efficaces d'octobre ont interrompu la baisse des niveaux, sans toutefois assurer une recharge durable des nappes. La recharge semble seulement avoir commencé localement en octobre. Les niveaux, témoignant de l'état de remplissage des réserves souterraines, sont surtout très bas par rapport aux moyennes d'octobre. 94 % des niveaux des nappes de Bretagne sont encore inférieurs aux normales.

A Rennes, le 5 novembre 2026


BRGM Bretagne - 2, rue de Jouanet - 35700 RENNES
Tél : 02 99 84 26 70
Contact : bretagne@brgm.fr




(*) L'indicateur de niveau traduit l'écart à la moyenne de la chronique du mois courant. Il est réparti en 7 classes, du niveau le plus bas (représenté en rouge), au niveau le plus haut (en bleu foncé).
(**) L'évolution récente traduit la variation du niveau d'eau sur les 15 derniers jours du mois (stable, à la hausse ou à la baisse).




Niveau de nappe à Saint-Ségal (29) en 2026 (BSS000XCLK)
(altitude du repère de mesure du niveau de nappe : 70,1 m NGF)




Niveau de nappe à Missiriac (56) en 2026 (BSS001BHVJ)
(altitude du repère de mesure : 20,74 m NGF)




Niveau de nappe à Trémeur (22) en 2026 (BSS000VPUH)
(altitude du repère de mesure : 68,3 m NGF)




Niveau de nappe à La Noë Blanche (35) en 2026 (BSS001BLWA)
(altitude du repère de mesure : 88,2 m NGF)




Indicateur Piézométrique Standardisé (IPS) à Saint-Ségal (29) en 2026 (BSS000XCLK)



IPS à Missiriac (56) en 2026 (BSS001BHVJ)



IPS à Trémeur (22) en 2026 (BSS000VPUH)



IPS à La Noë Blanche (35) en 2026 (BSS001BLWA)