

Bulletin de Situation des Nappes du bassin Adour-Garonne

État des nappes libres en janvier 2026

Date de publication : 8 février 2026

BRGM - Site de Toulouse
Pierre Le Cointe

Documentation

Les principes et la méthode de réalisation du Bulletin de Situation des Nappes (BSN) et du calcul des indicateurs sont présentés dans les rapports suivants :

- **Rapport BRGM RP-61807-FR** : *Établissement d'un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d'un index piézométrique standardisé* ;
- **Rapport BRGM RP-64147-FR** : *Proposition d'un indicateur piézométrique standardisé pour le Bulletin de Situation Hydrologique "Nappes"* ;
- **Rapport BRGM RP-67249-FR** : *Note sur l'utilisation de l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) - Bulletin de Situation Hydrogéologique (BSH)* ;
- **Rapport BRGM RP-67251-FR** : *Index Piézométrique Standardisé (IPS) - Bilans et comparaisons avec l'indicateur du BSH.*

Sources des données

- **Producteurs de données** : BRGM, Parc Naturel Régional des Grandes Causses, Conseil Départemental des Landes ;
- **Origine des données** : ADES via API Hub'Eau Piézométrie, HydroPortail via API Hub'Eau Hydrométrie et SIEau ;
- **Fonds cartographiques** : AEAG - Référentiel Masses d'Eau (MESO), BRGM – BDLISA, AEAG / IGN – BD TOPAGE, IGN – Géoportail / Admin Express, OpenStreetMap.

Liste des Indicateurs Globaux (IG) par département

- Ariège : IG21
- Aude : IG21, IG52
- Aveyron : IG22, IG26, IG47, IG52
- Cantal : IG47, IG52, IG54, IG58
- Charente : IG16, IG17, IG18, IG37, IG54
- Charente-Maritime : IG16, IG17, IG18, IG19
- Corrèze : IG22, IG54, IG58
- Creuse : IG58
- Dordogne : IG17, IG18, IG22, IG37, IG54
- Gard : IG26, IG52
- Haute-Garonne : IG21, IG52
- Gers : IG19, IG20, IG53
- Gironde : IG18, IG19, IG44
- Hérault : IG26, IG52
- Landes : IG19, IG20, IG53
- Lot : IG17, IG18, IG19, IG21, IG22, IG44, IG53
- Lot-et-Garonne : IG17, IG18, IG22,
- Lozère : IG26, IG47, IG52
- Puy-de-Dôme : IG47, IG58
- Pyrénées-Atlantiques : IG19, IG20
- Hautes-Pyrénées : IG20, IG21
- Deux-Sèvres : IG16, IG37
- Tarn : IG21, IG22, IG52
- Tarn-et-Garonne : IG21, IG22, IG52
- Vienne : IG37
- Haute-Vienne : IG54

Ensemble du bassin Adour-Garonne

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47


IG52

IG53

IG54

IG58

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

A l'échelle du bassin Adour-Garonne, après une période de transition en septembre et octobre 2025, la période de recharge 2025-2026 s'est véritablement amorcée en novembre. Elle se poursuit en janvier 2026, mais de manière atténuée. Pourtant, sans atteindre les records observés plus à l'est sur le pourtour méditerranéen, la pluviométrie a été supérieure à la normale, en particulier dans la partie sud-est du bassin.

Sectorisation comportements

Les nappes alluviales du bassin de l'Adour étaient le seul secteur caractérisé par des niveaux inférieurs à la moyenne ces derniers mois ; ce n'est plus le cas en janvier. A l'inverse, les niveaux sont très hauts à l'est du bassin, dans les karsts des Grands Causses et les nappes du socle les ceinturant. Un peu plus au nord, le seul secteur où les niveaux moyens mensuels sont orientés à la baisse est celui des nappes des formations volcaniques du Massif Central.

En résumé

Après un étiage 2025 peu sévère et un début de recharge conforme à la normale, celle-ci a ralenti en janvier. A l'échelle du bassin Adour-Garonne, les nappes se situent globalement entre les niveaux autour de la moyenne et modérément haut. Seule exception notable, les niveaux très hauts dans l'est du bassin (karsts et socle).

Ensemble du bassin Adour-Garonne

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47


IG52

IG53

IG54

IG58

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La part de niveaux orientés à la hausse passe de 80% ces deux derniers mois à 69% en janvier. Elle est compensée par l'augmentation de niveaux stables (20%), la part de niveaux orientés à la baisse (11%) restant quasiment constante depuis le début de la période de recharge. Celle-ci se poursuit donc, mais le mois de janvier se traduit par une baisse de son intensité à l'échelle du bassin.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS médian, modérément haut depuis 3 mois, se situe à la limite entre autour de la moyenne et modérément haut en janvier. La part de niveaux supérieurs à la moyenne redescend à 51% (66% en décembre 2025). Toutefois, la part de niveaux inférieurs à la moyenne continue de baisser (11% des points de suivi), avec l'absence, comme en décembre, de niveaux très bas. Près de trois quarts (72%) des points de suivi présentent un niveau autour de la moyenne ou modérément haut, signe d'une relative homogénéité à l'échelle du bassin. Plus précisément, le mois de janvier se caractérise par :

- Un petit cinquième (18%) de niveaux hauts (7%) ou très hauts (11%) ;
- Un tiers (33%) de niveaux modérément hauts ;
- 39% de niveaux autour de la moyenne ;
- 7% de niveaux modérément bas ;
- 4% (4 points de suivi) de niveaux bas et aucun niveau très bas.

Ensemble du bassin Adour-Garonne

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53

IG54

IG58


Évolution IPS

L'évolution de l'IPS confirme que la recharge a été un peu inférieure à la normale pour un mois de janvier. En effet, si, comme souvent, la majorité (54%) des points de suivi conservent leur classe d'IPS du mois précédent, les baisses (34%) sont bien plus nombreuses que les hausses (13%). Les fortes évolutions (2 classes et plus) restent limitées ; elles concernent 7 points de suivi au total, se répartissant équitablement entre hausses et baisses.


Année de référence

Depuis 2010, 2026 est la sixième année avec les niveaux les plus hauts à cette période de l'année, et la dernière avec un niveau moyen supérieur à la moyenne pour ce milieu d'hiver. Les années les plus proches sont les années 2014, 2021 et 2025, avec des niveaux également modérément hauts.

IPS_3mois Janvier



BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la moyenne (entre 115 et 180%), en particulier dans la partie sud du secteur.


Sectorisation comportements

Les niveaux sont plus élevés dans l'extrémité est du secteur. Il s'agit d'une tendance récente, non observée sur la moyenne des 3 derniers mois.

En résumé

La recharge a nettement marqué le pas, ce qui a tendance à ramener les niveaux autour de la moyenne pour un mois de janvier. La trajectoire saisonnière reste au-dessus de la moyenne, mais la recharge devra être complétée ces prochains mois.

IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Après 3 mois de recharge généralisée, celle-ci marque le pas en janvier puisque 4 des 7 piézomètres voient leur niveau baisser, les 3 autres restant en hausse.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen redescend à un niveau autour de la moyenne et les piézomètres reflètent cette distribution : 3 sont autour de la moyenne, un modérément bas et un modérément haut, 1 bas (Aigre, au niveau déjà plus bas ces derniers mois) et un très haut (Bellicou).


Évolution IPS

Ce mois de janvier se caractérise par un déficit de recharge, puisque la majorité des piézomètres voient leur classe d'IPS baisser, de une (3 ouvrages) ou deux (2 piézomètres) classes. Les deux baisses plus importantes sont pour Montigné et Aigre, qui affichent aussi les niveaux les plus bas. A l'inverse, Charmé est le seul ouvrage à voir sa classe d'IPS augmenter.


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent au-dessus de la moyenne (modérément hauts), avec une trajectoire proche de l'année 2021 (ou 1998 en plus ancien), et des niveaux un peu au-dessus de ceux de l'an dernier. Ils sont par contre nettement inférieurs à ceux de 2024, mais nettement supérieurs à ceux de 2022 et 2023.

IPS_3mois Janvier



IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Janvier 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale : autour de 175% dans la moitié ouest, autour de 120% dans la moitié sud-est.


Sectorisation comportements

Les niveaux sont plus bas (autour de la moyenne à modérément bas) dans la partie centrale, plus élevés (modérément hauts) à l'ouest et à l'extrémité sud-est.

En résumé

La recharge se poursuit, mais elle est un peu inférieure à la normale. Le niveau est entre autour de la moyenne et modérément haut, pour janvier comme pour les 3 derniers mois.

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit, avec une hausse quasi-généralisée des niveaux. Seule exception, le niveau stable à Torsac.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément haut à autour de la moyenne bien que plus de la moitié des piézomètres (5/9) affichent un niveau supérieur à celle-ci (modérément haut). Seuls deux ouvrages (Torsac et Bourrou) ont un niveau inférieur à la moyenne (modérément bas).

Évolution IPS

La recharge a été inférieure à la normale pour un mois de janvier, puisque 4 piézomètres voient leur IPS baisser d'une classe, contre une seule hausse, équivalente. Celle-ci concerne Saint-Agnant.

IG17 – Nappes des calcaires crétacés du Périgord et du bassin Angoumois

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont à la limite entre autour de la moyenne et modérément hauts, avec une trajectoire très proche de l'année 2009. Les deux dernières années, 2025 et, surtout, 2024, affichaient des niveaux plus hauts à la même période de l'année. Inversement, les niveaux étaient nettement plus bas début 2023.

IPS_3mois Janvier



IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - janvier 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale : autour de 180% dans la vallée de la Garonne, entre 120 et 150% pour ses affluents.


Sectorisation comportements

Aucune sectorisation particulière des niveaux n'est observée. Par contre, les niveaux sont stables dans la partie nord et en hausse dans le reste du secteur.

En résumé

La recharge se poursuit, mais elle est un peu inférieure à la normale. Le niveau reste modérément haut, pour janvier comme pour les 3 derniers mois.

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit avec une nette majorité de niveaux en hausse (8/11). Dans la partie nord du secteur, les niveaux sont toutefois stables (3 piézomètres concernés).

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut et plus de la moitié des niveaux (6/11) sont supérieurs à la moyenne, dont 2 niveaux hauts à Latresne et Mouliets-et-Villemartin. Un seul piézomètre présente un niveau inférieur à la moyenne, mais il s'agit d'un niveau bas, à Porchères.


Évolution IPS

La recharge a été inférieure à la normale pour un mois de janvier, puisque 6 piézomètres voient leur IPS baisser d'une classe, contre une seule hausse, équivalente. Celle-ci concerne Mouliets-et-Villemartin.


IPS_3mois Janvier

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également modérément hauts, avec une trajectoire proche de celle de l'année 2022. Parmi les années récentes, les niveaux étaient plus hauts en 2025 et, surtout, 2024, mais bien inférieurs en 2023, après un étiage 2022 marqué.




IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Janvier 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ● Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale : autour de 140 — 160% dans la partie sud, 2 fois la normale dans la partie nord et est.


Sectorisation comportements

Le seul niveau inférieur à la moyenne est enregistré à l'extrémité nord du secteur. Les niveaux supérieurs à la moyenne, eux, se regroupent plutôt dans la partie centrale du triangle plioquaternaire.

En résumé

La recharge, conforme à la normale, se poursuit. Les niveaux sont autour de la moyenne, mais plutôt proches des niveaux modérément hauts.

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit ; tous les niveaux sont en hausse, comme en décembre 2025.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne, comme la moitié des piézomètres (4/8) présentant suffisamment de données pour le calcul de cet indicateur. Parmi les 3 niveaux supérieurs à la moyenne, on note un niveau haut à Belin-Béliet. Inversement, le seul niveau inférieur à la moyenne est modérément bas, à Vendays-Montalivet.

Évolution IPS


La recharge a été conforme à la normale pour un mois de janvier, puisqu'un seul piézomètre voit sa classe d'IPS changer. Il s'agit d'une baisse d'une classe à Vendays-Montalivet.

Année de référence


Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont à la limite entre autour de la moyenne et modérément hauts, avec une trajectoire très proche de l'année 2013. Les deux dernières années, 2025 et, surtout, 2024, affichaient des niveaux plus hauts à la même période de l'année.

Inversement, les niveaux étaient plus bas en 2022 et nettement plus bas en 2023.

IPS_3mois Janvier



IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale : 140 — 160% pour les vallées des Gaves, autour de 180% pour celle de l'Adour.


Sectorisation comportements

Aucune véritable sectorisation particulière des niveaux n'est observée. Signalons tout de même que le niveau le plus bas est observé dans la vallée amont de l'Adour.

En résumé

Une recharge supérieure à la normale bienvenue ramène les niveaux autour de la moyenne. Compte tenu du déficit des mois précédents, elle devra se poursuivre pour éviter de redescendre en-dessous de la moyenne.

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit ; tous les niveaux sont en hausse, sans exception cette fois.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément bas à autour de la moyenne, à l'instar de la moitié des piézomètres (4/8). Les autres se répartissent entre niveaux modérément hauts (2 ouvrages) et niveaux inférieurs à la moyenne : un niveau modérément bas et un niveau bas à Peyta.


Évolution IPS

C'est l'un des rares secteurs où la recharge a été supérieure à la normale en janvier, compensant en partie le déficit des mois précédents. Une seule baisse d'une classe d'IPS est enregistrée à Campet-et-Lamolère contre 5 hausses, dont 2 de plus d'une classe, à Tarsac (2 classes) et Aire-sur-l'Adour (3 classes).


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément bas, avec une trajectoire proche des années 2012 et 2016. Toutes les années récentes présentaient des niveaux supérieurs à la moyenne à cette époque de l'année, à l'exception de 2023 (niveau autour de la moyenne). Il faut remonter à 2019 pour trouver des niveaux plus bas.

IPS_3mois Janvier



IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale (170% en moyenne), avec un secteur moins excédentaire autour du confluent Garonne-Tarn (135%) et d'autres plus arrosés (2 fois la normale dans la vallée amont de la Garonne et celle de l'Agout).


Sectorisation comportements

Comme les mois précédents, la majorité des niveaux les plus bas s'observent dans les vallées amont de la Garonne et de l'Ariège et, à l'opposé, dans la partie aval de la Garonne.

En résumé

La recharge, conforme à la normale, se poursuit. Les niveaux restent modérément hauts, pour janvier comme pour les 3 derniers mois.

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit, avec une hausse quasi-généralisée des niveaux. Seule exception, le niveau stable aux Bordes.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut, comme pour 8 des 18 piézomètres avec suffisamment de données pour le calcul de l'indicateur. Trois autres ouvrages affichent même un niveau haut et il ne reste plus que 2 piézomètres avec un niveau inférieur à la moyenne : modérément bas à Saint-Laurent et bas aux Bordes.


Évolution IPS

La recharge a été conforme à la normale puisque 11 des 18 piézomètres conservent leur classe d'IPS de décembre 2025. De plus, les changements sont limités à une classe et équilibrés : 4 hausses contre 3 baisses. Parmi ces dernières, on retrouve à nouveau le piézomètre des Bordes.


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également modérément hauts, avec une trajectoire proche de celle de l'année 2003. L'année 2024 est également un bon point de comparaison. Par contre, à l'exception de 2023 (niveaux modérément bas), toutes les autres années récentes (2020, 2021, 2022, 2025) présentaient des niveaux plus hauts.

IPS_3mois Janvier



IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations un peu supérieures à la normale (120%), surtout autour de la vallée du Lot (140%).


Sectorisation comportements

Aucune sectorisation particulière des niveaux n'est observée. Par contre, les niveaux stables sont plutôt observés dans la partie nord.

En résumé

La recharge se poursuit, globalement conforme à la normale, avec un petit déficit sur les bassins du Blagour de Souillac et de l'Ouyse. Les niveaux sont autour de la moyenne en janvier, mais restent modérément hauts moyennés sur 3 mois.

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit avec une nette majorité de niveaux en hausse (5/7). Les 2 autres niveaux, stables, sont observés dans la partie nord du secteur, pour la source du Blagour de Souillac et l'Ouyse à Thémines.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément haut à autour de la moyenne. Ce sont d'ailleurs les deux seules classes observées sur les 7 points de suivi dans ce secteur relativement homogènes. Les niveaux modérément hauts (4/7) sont d'ailleurs les plus nombreux, mais certains sont proches de la classe inférieure, ce qui explique le positionnement de la moyenne.


Évolution IPS

La recharge a été conforme à la normale sur la majorité du secteur, avec des classes d'IPS stables pour 5 ouvrages. Seules exceptions, toujours la source du Blagour de Souillac et l'Ouyse à Thémines, qui sont aussi 2 des 3 points à afficher un niveau autour de la moyenne.


IPS_3mois Janvier

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément hauts, avec une trajectoire proche de celle de l'année dernière. Dans les années récentes, les niveaux étaient aussi comparables pour 2021 et 2022, et un peu supérieurs en 2020 et, surtout, 2024. Seule 2023 présentait des niveaux bien inférieurs (niveaux bas).



IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 26 - Grands Causses - Janvier 2026



Contexte hydrologique

Précipitations très supérieures à la normale, en particulier dans la partie est, où elles sont plus de 2 fois supérieures aux normales pour le mois de janvier.

Sectorisation comportements

Les niveaux sont un peu plus bas dans la partie nord (sources des Douzes à Muret-le-Château et de Bernades).

En résumé

Les niveaux étaient très hauts et le restent, notamment en raison de l'intensité des précipitations de janvier.


Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 26 - Grands Causses - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Les niveaux sont majoritairement stables (5/9), contre 3 hausses et une baisse pour la source de la Burle. Toutefois, compte tenu des précipitations enregistrées en janvier et du fait que les niveaux étaient déjà presque partout très hauts en décembre 2025, cela ne permet pas de conclure à un manque de recharge.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste très haut, comme 7 des 9 sources. Seules exceptions, les sources des Douzes à Muret-le-Château et de Bernardes, aux niveaux modérément hauts.


Évolution IPS

La recharge est conforme à la normale pour un mois de janvier. En effet, une seule évolution par rapport à décembre 2025 est observée : le niveau de la source des Douzes à Muret-le-Château passe de haut à modérément haut.


IPS_3mois Janvier

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également très hauts, avec une trajectoire proche des années 2020 et 2004, les deux seules à présenter des niveaux plus hauts qu'en ce début 2026. On est donc au-dessus des années 2024 et 2025, aux niveaux autour de la moyenne, et, encore plus nettement, des années 2022 (niveaux modérément bas) et 2023 (niveaux bas).




IG 26 - Grands Causses - Janvier 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	○ Indéterminé

IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations un peu supérieures à la normale (120%), surtout dans la partie ouest (140 — 150%).


Sectorisation comportements

Aucune véritable sectorisation n'est observée. Les niveaux un peu plus hauts sont mesurés au nord-est et à l'extrémité sud du secteur.

En résumé

La recharge se poursuit, mais elle est inférieure à la normale. Le niveau est autour de la moyenne en janvier, même s'il reste proche d'un niveau modérément haut.

IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit, avec une hausse quasi-généralisée des niveaux. Seule exception, le niveau stable du piézomètre d'Outres 1.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément haut à autour de la moyenne, mais reste proche de la limite entre les deux classes. La majorité des piézomètres (5/7) suit la même trajectoire et affiche des niveaux autour de la moyenne en janvier. Les deux autres (Blanzay et Tourtoirac) présentent un niveau modérément haut.


Évolution IPS

La recharge a été inférieure à la normale puisque 6 des 7 ouvrages voient leur IPS baisser d'une classe. Seule exception, le piézomètre de Blanzay qui conserve son niveau modérément haut.


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément hauts, avec une trajectoire quasi-identique à celle de 2003. Parmi les années récentes, 2026 se situe entre 2021 et 2025, avec des niveaux un peu plus hauts l'an dernier. Ils étaient encore plus hauts en 2020 et 2024 et, inversement, nettement plus bas en 2022 et, surtout, 2023.

IPS_3mois Janvier



IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale (150%)


Sectorisation comportements

Aucune sectorisation des niveaux n'est observée. Par contre, le niveau stable (IPS pas encore calculable) est enregistré au sud-est du secteur.

En résumé

La recharge se poursuit dans ce secteur inertiel aux variations limitées. Les niveaux restent autour de la moyenne.

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La recharge se poursuit avec, comme en décembre 2025, deux niveaux en hausse pour un niveau stable (Verdelais).

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS ne peut être calculé pour le piézomètre de Verdelais (chronique trop courte). Pour les deux autres, le niveau est autour de la moyenne, une situation identique à celle des 7 derniers mois.


Évolution IPS

Dans ce secteur inertiel, les évolutions sont limitées. Pour le 7^{ème} mois consécutif, aucun changement de classe n'est enregistré. La recharge est donc conforme à la normale.


IPS_3mois Janvier

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également autour de la moyenne, avec une trajectoire proche des années 2011 et 2015. A l'exception de 2023 (niveaux bas), toutes les années récentes (2020 à 2025) présentaient des niveaux plus hauts, avec un record en 2024 (niveaux très hauts).



IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Janvier 2026



Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale (120 — 130%)

Sectorisation comportements

Deux points de suivi uniquement. Aucune sectorisation.

En résumé

Un manque de recharge qui n'affecte pas les niveaux autour de la moyenne, au mois de janvier comme moyennés sur les 3 derniers mois.


Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Malgré les précipitations de janvier, les niveaux sont en baisse sur les deux piézomètres.


Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen est autour de la moyenne, comme les niveaux des deux ouvrages. Il se rapproche toutefois du niveau modérément bas.

Évolution IPS

Le manque de recharge en janvier n'est pas suffisant pour faire baisser la classe d'IPS des deux piézomètres, pour qui la situation reste identique à celle de décembre 2025.


IPS_3mois Janvier



Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également autour de la moyenne, avec une trajectoire quasi-identique à 2022 et un peu en-dessous des niveaux de l'an dernier. Parmi les autres années récentes, seule 2023 affichait des niveaux inférieurs (modérément bas). A l'inverse, 2024 affichait des niveaux hauts records.

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ● Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale dans la partie ouest (150%) et très excédentaires dans les parties est et sud : 2 à 2,5 fois la normale pour un mois de janvier.


Sectorisation comportements

Aucune sectorisation particulière n'est observée, alors que les niveaux étaient plus bas dans la partie sud ces derniers mois.

En résumé

Une recharge excédentaire au sud et conforme à la normale ailleurs conduisent à des niveaux très hauts en janvier, hauts moyennés sur les 3 derniers mois.

IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Évolutions contrastées dans ce secteur pourtant très arrosé : 2 niveaux stables, une baisse (source du Pradet) et une hausse (source de Céras), plus au sud.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de haut à très haut. C'est également le niveau affiché par 3 des 4 sources. La seule exception concerne la source 2 du Gail, au niveau modérément haut.


Évolution IPS

Évolutions contrastées là aussi : une baisse d'une classe (source 2 du Gail), une source sans changement, une hausse d'une classe et une hausse de 3 classes pour la source de Céras. La recharge a donc été supérieure à la normale au sud et conforme à la normale au nord.


IPS_3mois Janvier

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont hauts, mais à la limite des niveaux modérément hauts. Seule l'année 2020 présentait des niveaux supérieurs à cette période de l'année. Les années 2015 et 2011 affichaient des niveaux un peu plus bas, devant les années 2025 et 2024. Parmi les autres années récentes, 2022 et, surtout, 2023, affichaient par contre des niveaux nettement plus bas.




IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Janvier 2026



- | Niveau des nappes | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

- | Evolution récente | |
|-------------------|-------------|
| ▼ | En baisse |
| ■ | Stable |
| ▲ | En hausse |
| ○ | Indéterminé |

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations autour de 2 fois la normale pour un mois de janvier.


Sectorisation comportements

Un gradient des niveaux du nord (niveaux plus hauts) au sud (niveaux plus bas) est constaté.

En résumé

La recharge se poursuit plus ou moins dans ce secteur inertiel aux variations limitées. Les niveaux restent modérément hauts.

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Évolutions contrastées dans ce secteur pourtant très arrosé : 2 niveaux stables, une baisse (Villeneuve-de-Marsan) et une hausse (Puydesseaux).

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut, comme le piézomètre de Villeneuve-de-Marsan. Au sud, à Pujo-le-Plan, le niveau est autour de la moyenne tandis qu'il est haut sur les 2 ouvrages au nord.

Évolution IPS

Dans ce secteur inertiel, les évolutions sont limitées. Après 2 changements d'une classe en décembre 2025, aucun changement n'est observé en janvier. La recharge est donc conforme à la normale.

IG53 – Nappe des sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également modérément hauts, avec une trajectoire proche des années 2025 et 2021. Parmi les années récentes, ils étaient un peu plus hauts en 2022 et plus bas en 2023 et 2024.

IPS_3mois Janvier



IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Janvier 2026



Contexte hydrologique

Précipitations conformes à la normale dans la partie ouest, excédentaires dans la partie est (130%), à partir du bassin versant de la Vézère.

Sectorisation comportements

Les niveaux les plus bas sont enregistrés au nord-est tandis que le niveau le plus haut est mesuré plus au sud. Sinon, le secteur est plutôt homogène.

En résumé

La recharge, pas généralisée, a été inférieure à la normale, faisant passer les niveaux de modérément hauts à autour de la moyenne en janvier.


Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Évolutions contrastées dans ce secteur : 5 hausses, 4 baisses et 3 niveaux stables. Les précipitations n'ont pas suffi à provoquer une recharge généralisée.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément haut à autour de la moyenne. C'est désormais le niveau affiché par une majorité de piézomètres (7/12). Trois ouvrages affichent un niveau supérieur à la moyenne, dont un niveau haut à Mansac. Inversement, les deux niveaux inférieurs à la moyenne, tout deux modérément bas, sont pour les piézomètres voisins de Saint-Merd-les-Oussines.

Évolution IPS

La recharge a été inférieure à la normale puisque 7 des 12 piézomètres voient leur classe d'IPS baisser, contre aucune hausse. Pour Lanouaille et Roannès-Saint-Mary, il s'agit même d'une baisse de 2 classes.

IG54 – Nappes du socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont modérément hauts, avec une trajectoire identique à celle de l'année 2014. Parmi les années récentes, les niveaux étaient plus hauts en 2020 et 2025 et nettement plus hauts en 2024. Inversement, ils étaient un peu plus bas en 2021 et 2022 et nettement plus bas en 2023.

IPS_3mois Janvier



IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Janvier 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - janvier 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

Précipitations supérieures à la normale (120 — 130%), sauf dans la partie nord, en déficit par rapport à la normale (60%), cas unique dans le bassin Adour-Garonne en ce mois de janvier 2026.


Sectorisation comportements

Des niveaux un plus bas au nord, des niveaux stables plus au sud.

En résumé

La recharge, conforme à la normale, se poursuit. Les niveaux sont modérément hauts.

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Janvier 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Évolutions contrastées dans ce secteur : 2 hausses et 2 niveaux stables. Aucun piézomètre n'est situé dans la frange nord où un déficit de pluviométrie a été constaté.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut, comme 3 des 4 ouvrages du secteur. A Saint-Germain-Lavolps, le niveau est autour de la moyenne.

Évolution IPS

La recharge est plutôt conforme à la normale puisqu'un seul changement de classe d'IPS est mesuré. Il s'agit d'une baisse d'une classe pour le piézomètre de Chalignac.

IG58 – Nappes du socle de la Combraille et du plateau de Millevaches

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont hauts. Seule l'année 2024 présentait des niveaux plus hauts à cette période de l'année. De l'autre côté, c'est l'année dernière qui est la plus proche de la situation actuelle.

IPS_3mois Janvier



IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - janvier 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé