

Bulletin de Situation des Nappes du bassin Adour-Garonne

État des nappes libres en juin 2026

Date de publication : 4 juillet 2026

BRGM - Site de Toulouse
Pierre Le Cointe

Documentation

Les principes et la méthode de réalisation du Bulletin de Situation des Nappes (BSN) et du calcul des indicateurs sont présentés dans les rapports suivants :

- **Rapport BRGM RP-61807-FR** : *Établissement d'un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d'un index piézométrique standardisé* ;
- **Rapport BRGM RP-64147-FR** : *Proposition d'un indicateur piézométrique standardisé pour le Bulletin de Situation Hydrologique "Nappes"* ;
- **Rapport BRGM RP-67249-FR** : *Note sur l'utilisation de l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) - Bulletin de Situation Hydrogéologique (BSH)* ;
- **Rapport BRGM RP-67251-FR** : *Index Piézométrique Standardisé (IPS) - Bilans et comparaisons avec l'indicateur du BSH*.

Sources des données

- **Producteurs de données** : BRGM, Parc Naturel Régional des Grandes Causses, Conseil Départemental des Landes ;
- **Origine des données** : ADES via API Hub'Eau Piézométrie, HydroPortail via API Hub'Eau Hydrométrie et SIEau ;
- **Fonds cartographiques** : AEAG - Référentiel Masses d'Eau (MESO), BRGM – BDLISA, AEAG / IGN – BD TOPAGE, IGN – Géoportail / Admin Express, OpenStreetMap.


Liste des Indicateurs Globaux (IG) par département

- Ariège : IG21
- Aude : IG21, IG52
- Aveyron : IG22, IG26, IG47, IG52
- Cantal : IG47, IG52, IG54, IG58
- Charente : IG16, IG17, IG18, IG37, IG54
- Charente-Maritime : IG16, IG17, IG18, IG19
- Corrèze : IG18, IG22, IG54, IG58
- Creuse : IG58
- Dordogne : IG17, IG18, IG22, IG37, IG54
- Gard : IG26, IG52
- Haute-Garonne : IG21, IG52
- Gers : IG20, IG21, IG53
- Gironde : IG18, IG19, IG44
- Hérault : IG26, IG52
- Landes : IG19, IG20, IG53
- Lot : IG17, IG18, IG22, IG52, IG54
- Lot-et-Garonne : IG17, IG18, IG19, IG21, IG22, IG44, IG53
- Lozère : IG26, IG47, IG52
- Puy-de-Dôme : IG47, IG58
- Pyrénées-Atlantiques : IG19, IG20
- Hautes-Pyrénées : IG20, IG21
- Deux-Sèvres : IG16, IG37
- Tarn : IG21, IG22, IG52
- Tarn-et-Garonne : IG21, IG22, IG52
- Vienne : IG37
- Haute-Vienne : IG54

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en juin 2026

Bassin
Adour-
Garonne

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Contexte hydrologique

La période de recharge 2025-2026 a été courte, de novembre à février, mais marquée par des précipitations exceptionnelles à la fin de celle-ci. Par contre, le déficit de précipitations en mars et avril a mis fin à la recharge de manière anticipée. En juin, ce déficit est à nouveau très marqué sur l'ensemble du bassin (42% de la normale en moyenne).

Sectorisation comportements

Les niveaux restent bas sur les Causses du Quercy et les aquifères volcaniques, et le deviennent sur les nappes de socle des secteurs les plus au nord. Inversement, les seuls niveaux restant supérieurs à la moyenne sont les nappes plus inertielles de l'Armagnac et les nappes alluviales de la Garonne amont et de ses affluents.

En résumé

La vidange des nappes se poursuit un peu plus vite que la normale, sous l'effet du déficit de précipitations et des températures caniculaires, empêchant toute recharge. Pour la première fois depuis août 2025, les niveaux sont majoritairement sous la moyenne et le nombre de niveaux bas ou très bas a doublé en juin. Moyennée sur 3 mois, la situation reste un peu plus favorable avec des niveaux autour de la moyenne.

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en juin 2026

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47


IG52

IG53

IG54

IG58

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

Des précipitations déficitaires, des températures élevées maximisant l'évaporation et l'évapotranspiration : la vidange des nappes est générale, avec une baisse des niveaux sur 93% des indicateurs et des niveaux stables sur les 7% restants.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS médian est désormais modérément bas et la part de niveaux inférieurs à la moyenne atteint 60%, une première depuis mai 2023, quand celle des niveaux supérieurs à la moyenne tombe à 22%. Plus précisément, le mois de juin se caractérise par :

- 10% de niveaux hauts (9%) ou très hauts (un point de suivi) ;
- 12% de niveaux modérément hauts ;
- Un cinquième (19%) de niveaux autour de la moyenne ;
- 28% de niveaux modérément bas ;
- Un tiers (32%) de niveaux bas (22%) ou très bas (10%).

Évolution IPS

La vidange est un peu supérieure à la normale en juin, puisque 44% des points de suivi voient leur classe d'IPS baisser, majoritairement d'une classe (34%), contre 51% de points qui conservent leur classe d'IPS de mai. Les hausses, toutes d'une classe, sont quant à elles limitées à 6 points de suivi.

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en juin 2026

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53

IG54


IG58

Année de référence


Moyennés sur le printemps (avril à juin), les niveaux sont autour de la moyenne, proches de ceux de l'année 2021.

Parmi les années récentes, ils étaient plus bas en 2022 et 2023 (modérément bas) et plus hauts en 2025 (autour de la moyenne, mais proches de niveaux modérément hauts) et, surtout, 2024 (niveaux hauts).

IPS_3mois Juin



BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (33% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au nord d'Angoulême et au nord-est du secteur (moins de 20% de la normale).


Sectorisation comportements

Le niveau le moins bas (autour de la moyenne), est observé au nord-est du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit un peu plus rapidement que la normale mais le niveau reste modérément bas, se rapprochant toutefois d'un niveau bas. Moyenné sur 3 mois, le niveau est désormais également modérément bas.

IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit mais, après 3 mois consécutifs où tous les indicateurs sans exception affichaient un niveau en baisse, il y a une exception en juin : le niveau est stable à Bellicou.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément bas, mais il n'y a plus qu'un seul piézomètre affichant un niveau autour de la moyenne (Bellicou). Les 6 autres se répartissent également entre niveaux modérément bas, bas et très bas (Aigre et Montigné).


Évolution IPS

Signe d'une vidange qui reste un peu supérieure à la normale, 4 des 7 points de suivi enregistrent une baisse d'une classe d'IPS en juin, les 3 autres conservant celle de mai.


Situation en juin 2026

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont modérément bas, et se rapprochent de ceux de l'année 2003. Parmi les années récentes, ils étaient plus bas en 2022 (niveaux bas) et plus hauts en 2021 (modérément bas), 2023 et 2025 (autour de la moyenne) et 2024 (très hauts).



IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Juin 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (36% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au sud d'Angoulême (moins de 20% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux les plus bas, inférieurs à la moyenne, se situent dans la partie centrale du secteur. A l'ouest et au sud-est, ils sont supérieurs à la moyenne.

En résumé

La vidange se poursuit mais est plutôt conforme à la normale dans ce secteur. L'IPS moyen reste autour de la moyenne avec de forts contrastes entre les niveaux les plus hauts et les plus bas. Moyenné sur 3 mois, le constat est similaire, avec, là aussi, un niveau autour de la moyenne.

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin, pour un troisième mois consécutif.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne. Les niveaux supérieurs à la moyenne (4) sont aussi nombreux que les niveaux inférieurs à la moyenne (4). Comme en mai, il reste deux niveaux hauts (Bois et Ste-Radegonde) mais aussi un niveau très bas à Bourrou.

Évolution IPS

Dans ce secteur, la vidange a été plutôt conforme à la normale puisque 8 des 10 points de suivi conservent leur classe d'IPS de mai. Les 2 seules baisses d'une classe concernent les piézomètres de St-Agnant et Rouffiac.

IG17 – Nappes des calcaires crétacés du Périgord et du bassin Angoumois

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53

IG54


IG58

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont désormais autour de la moyenne également, proches de ceux de l'année 2021. Parmi les années récentes, ils étaient plus hauts en 2025 (modérément hauts) et, surtout, 2024 (très hauts), mais plus bas en 2022 et 2023 (modérément bas).

IPS_3mois Juin



IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Juin 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (41% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué dans la partie aval de l'estuaire de la Gironde (23% de la normale).


Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation, mais le seul niveau supérieur à la moyenne (modérément haut), se situe dans la partie aval de la Garonne, à proximité de Bordeaux.

En résumé

La vidange se poursuit, plus rapidement que la normale, et l'IPS moyen devient ainsi modérément bas. Moyennée sur 3 mois, la situation est identique et proche des années 2022 et 2023.

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe d'autour de la moyenne à modérément bas. 8 des 11 piézomètres affichent un niveau inférieur à la moyenne, dont 4 niveaux bas et un niveau très bas à Allassac. Seul le piézomètre de Latresne conserve un niveau supérieur à la moyenne (modérément haut).

Évolution IPS


La vidange est supérieure à la normale puisque 8 des 11 points de suivi voient leur classe d'IPS baisser, dont 2 de 2 classes (Allassac et Floudès). Les 3 autres conservent leur classe d'IPS de mai.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont désormais modérément bas également, légèrement inférieurs à ceux des années 2022 et 2023. Ils étaient plus hauts sur les autres années récentes : autour de la moyenne en 2021 et 2025 (mais à la limite avec les niveaux modérément hauts dans ce dernier cas) et hauts (à la limite avec les niveaux très hauts) en 2024.

IPS_3mois Juin



IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Juin 2026




Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (42% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué sur la façade atlantique au nord du courant de Contis (23% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux les plus hauts sont observés dans la partie sud du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit, plus rapidement que la normale, et l'IPS moyen devient ainsi autour de la moyenne. Moyennée sur 3 mois, la situation est identique.

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément haut à autour de la moyenne. 5 des 9 points de suivi présentent désormais un niveau inférieur à la moyenne, mais ils sont tous modérément bas. Parmi les deux niveaux supérieurs à la moyenne, le niveau reste haut à Belin-Béliet.

Évolution IPS


La vidange est supérieure à la normale puisque 6 des 9 points de suivi voient leur classe d'IPS baisser, dont 2 de 2 classes (Brach et Ychoux). Les 3 autres conservent leur classe d'IPS de mai.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont désormais autour de la moyenne également, se situant entre ceux des années 2015 et 2021. Parmi les autres années récentes, ils étaient plus bas en 2023 (modérément bas) et, surtout, en 2022 (niveaux bas). Inversement, ils étaient plus hauts en 2025 (modérément hauts) et, surtout, 2024 (très hauts).

IPS_3mois Juin



IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Juin 2026




Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (44% de la normale en moyenne), un déficit un peu moins marqué autour de Mont-de-Marsan (50% de la normale).


Sectorisation comportements

Le niveau le plus haut, et le seul restant supérieur à la moyenne, se situe au nord du secteur, à proximité de Mont-de-Marsan.

En résumé

La vidange se poursuit, plus rapidement que la normale, et l'IPS moyen devient ainsi modérément bas. Moyennée sur 3 mois, la situation est identique et proche de celle de 2022.

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin, ce qui est une première pour cette année dans ce secteur.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe d'autour de la moyenne à modérément bas. 7 des 8 piézomètres affichent un niveau inférieur à la moyenne, dont 4 niveaux bas et un niveau très bas à Grenade-sur-l'Adour. Seul le piézomètre de Campet-et-Lamolère conserve un niveau supérieur à la moyenne (modérément haut).

Évolution IPS


La vidange est supérieure à la normale puisque 6 des 8 points de suivi voient leur classe d'IPS baisser, dont 3 de 2 classes (Grenade-sur-l'Adour, Aire-sur-l'Adour et Peyta). Les 2 autres conservent leur classe d'IPS de mai. Dans le cas de Peyta, la reprise anticipée des prélèvements en raison de la sécheresse explique toutefois en partie cette forte baisse de l'IPS.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont désormais modérément bas également, quasiment identiques à ceux de 2022. Ils étaient un peu plus bas en 2021 (modérément bas également) mais plus hauts sur les autres années récentes : modérément bas (mais à la limite avec les niveaux autour de la moyenne) en 2025, autour de la moyenne en 2024 (à la limite avec les niveaux modérément hauts) et modérément hauts (à la limite avec les niveaux autour de la moyenne) en 2023.

IPS_3mois Juin



IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (39% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué dans les vallées amont de l'Ariège et du Grand Hers ainsi que celle du Salat (jusqu'à 20% de la normale).


Sectorisation comportements

Les seuls niveaux inférieurs à la moyenne sont observés dans la vallée de la Garonne, à ses limites amont et aval du secteur. Les niveaux autour de la moyenne sont, eux, enregistrés dans la vallée de l'Ariège et les vallées amont du Tarn, de l'Agout et de l'Aveyron. Dans la partie centrale, les niveaux sont tous supérieurs à la moyenne.

En résumé

La vidange se poursuit, plus rapidement que la normale, mais l'IPS moyen reste modérément haut pour le moment dans ce secteur inertiel qui résiste encore un peu à la sécheresse. Moyenné sur 3 mois, le niveau est également modérément haut.

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin, ce qui est une première pour cette année dans ce secteur.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut mais se rapproche de la moyenne. 3 points de suivi présentent désormais un niveau inférieur à la moyenne (modérément bas). Toutefois, la moitié (9/18) des niveaux restent supérieurs à la moyenne, dont 3 niveaux hauts et un niveau très haut à Colayrac-St-Cirq.

Évolution IPS


La vidange est supérieure à la normale puisque 10 des 18 points de suivi voient leur classe d'IPS baisser, dont 2 de 2 classes (St-Elix et Montaut). Les 8 autres conservent leur classe d'IPS de mai.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont désormais modérément hauts également, très proches de ceux de 2018. Ils étaient plus bas pour toutes les années récentes : modérément hauts en 2024 également, autour de la moyenne en 2021, 2022 et 2025 et modérément bas en 2023.

IPS 3mois Juin



IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (48% de la normale en moyenne), un déficit un peu moins marqué au sud de la rivière Lot et autour de la vallée de la Dordogne (53 à 63% de la normale)


Sectorisation comportements

Les niveaux les moins bas (modérément bas) sont observés au nord du secteur et de la vallée de la Dordogne.

En résumé

La vidange se poursuit, conformément à la normale en juin, car les niveaux étaient déjà bas dans ce secteur réactif qui souffre du déficit de précipitations. Moyenné sur 3 mois, l'IPS moyen devient lui aussi bas.

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste un niveau bas, comme 6 des 8 points de suivi. Les 2 exceptions sont les niveaux modérément bas enregistrés sur la source du Blagour de Souillac et le piézomètre de Chaufour-sur-Vell.

Évolution IPS


Dans ce secteur, la vidange a été plutôt conforme à la normale puisque 6 des 8 points de suivi conservent leur classe d'IPS de mai. Les 2 seules évolutions sont des hausses d'une classe sur la source de la Gourgue et l'Ouyse à Thémines.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux passent de modérément bas à bas. Seule l'année 2011 présentait des niveaux plus bas à cette période de l'année depuis que le suivi est suffisant, soit 2005. Toutes les années récentes présentaient donc des niveaux supérieurs : également bas en 2021, modérément bas en 2023, autour de la moyenne en 2022, modérément hauts en 2025 et très hauts en 2024.

IPS_3mois Juin



IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Juin 2026




Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

IG 26 - Grands Causses - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (38% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au sud du secteur (25% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux les plus bas sont observés à l'ouest du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit, conformément à la normale en juin, avec des niveaux qui restent autour de la moyenne, dans ce secteur karstique où le déficit de précipitations a été moindre que celui des Causses du Quercy. Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent même modérément hauts et quasiment identiques à ceux de l'an dernier.

IG 26 - Grands Causses - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit, mais c'est un des rares secteurs où elle n'est pas généralisée puisque, si 6 des 9 sources présentent des niveaux en baisse, les 3 autres ont des niveaux stables par rapport à ceux de mai.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne. 4 sources présentent toujours des niveaux supérieurs à la moyenne, dont 2 niveaux hauts pour les sources de la Burle et de St-Chély. Inversement, les niveaux sont modérément bas pour les sources du Ségala et des Douzes à Muret-le-Château.

Évolution IPS

Dans ce secteur, la vidange a été plutôt conforme à la normale puisque 4 des 9 points de suivi conservent leur classe d'IPS de mai, mais les évolutions se répartissent entre hausses d'une classe pour 3 sources et baisse d'une classe sur les 2 dernières.

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Situation en juin 2026

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément hauts (mais proches de la limite avec les niveaux autour de la moyenne) et quasiment identiques à ceux de 2025. Parmi les années récentes, ils étaient plus élevés en 2024 (modérément hauts également, à la limite avec les niveaux hauts) mais plus bas en 2021, 2022 et 2023 (niveaux modérément bas).




IG 26 - Grands Causses - juin 2026



Niveau des nappes			Evolution récente	
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse	■ Stable	▲ En hausse
● Hauts	● Bas	○ Données insuffisantes	● Indéterminé	
● Modérément hauts	● Très bas			
● Autour de la moyenne				

IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (30% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué à l'est d'Angoulême et dans la pointe nord-ouest du secteur (18 à 20% de la normale).

Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation des comportements : le niveau le plus haut est enregistré au nord-ouest mais les 2 niveaux les plus bas sont observés au nord-ouest et en pointe sud du secteur.

En résumé


La vidange se poursuit, plus rapidement que la normale, et l'IPS moyen devient ainsi modérément bas. Moyennée sur 3 mois, la situation est plutôt autour de la moyenne.

Bassin
Adour-
Garonne
IG16
IG17
IG18
IG19
IG20
IG21
IG22
IG26
IG37
IG44
IG47
IG52
IG53
IG54
IG58


Situation en juin 2026

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux passent de modérément hauts à autour de la moyenne, proches de ceux de 2010, 2012 et 2021. Parmi les années récentes, ils étaient plus élevés en 2025 (modérément hauts) et, surtout, 2024 (très hauts). Inversement, ils étaient plus bas en 2023 (autour de la moyenne) et 2022 (modérément bas).




IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Juin 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (50% de la normale en moyenne), un déficit un peu moins marqué à l'est de Bordeaux (64% de la normale).


Sectorisation comportements

Secteur au nombre de points de suivi limité, avec des comportements identiques en juin.

En résumé

Les évolutions restent limitées dans ce secteur plus inertiel mais la vidange se poursuit et les niveaux redeviennent autour de la moyenne, comme pendant les 8 mois ayant précédé la forte recharge initiée par les précipitations exceptionnelles de février. Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également autour de la moyenne et similaires à ceux de l'an dernier.

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin, pour un troisième mois consécutif.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne. C'est aussi la classe d'IPS dans laquelle se trouvent les 2 points de suivi présentant suffisamment de données pour le calcul de cet indicateur.

Évolution IPS


Signe d'une vidange un peu supérieure la normale, le piézomètre de St-Médard-d'Eyrans enregistre une baisse d'une classe, avec un mois de retard sur celui du Taillan-Médoc qui, lui, conserve sa classe d'IPS de mai.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux passent de modérément hauts à autour de la moyenne, très proches de ceux de 2025. Parmi les années récentes, ils étaient supérieurs en 2021 (modérément hauts) et, surtout, 2024 (très hauts). Inversement, ils étaient plus bas en 2022 et 2023 (modérément bas).

IPS_3mois Juin



IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Juin 2026



Niveau des nappes				Evolution récente	
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse	■ Stable	▲ En hausse	○ Indéterminé
● Hauts	● Bas				
● Modérément hauts	● Très bas				
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes				

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (50% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué à l'ouest de St-Flour (37% de la moyenne), en pointe sud et au nord-est du secteur (autour de 33% de la normale).


Sectorisation comportements

Secteur au nombre de points de suivi limité, avec des comportements différents en juin.

En résumé

Avec les Causses du Quercy, c'est le secteur du bassin présentant les niveaux les plus bas, puisqu'ils sont bas à la fois au mois de juin et moyennés sur les 3 derniers mois. La vidange est toutefois conforme à la normale puisque la situation est identique à celles des mois d'avril et mai. Dans ce secteur plutôt réactif, cette stabilité est notable.

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque les niveaux sont en baisse sur les 2 points de suivi.

Indice Piézométrique Standardisé

La situation est identique à celle d'avril et mai : IPS moyen correspondant à un niveau bas, niveau modérément bas à Moussages et très bas à Espinchal.

Évolution IPS


Signe d'une évolution conforme à la normale pour un mois de juin, les deux piézomètres conservent leur classe d'IPS du mois de mai (et même d'avril).

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent bas. Seule 2011 présentait des niveaux inférieurs (très bas). Toutes les années récentes présentaient donc des niveaux plus hauts : modérément bas en 2022 et 2025, modérément hauts en 2021 et 2023 et hauts en 2024.

IPS_3mois Juin




IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Juin 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	○ Indéterminé

IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (40% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au sud-est du secteur (jusqu'à 11% de la normale seulement).


Sectorisation comportements

Pas de sectorisation des comportements particulière en juin.

En résumé

La vidange se poursuit, à peine supérieure à la normale. Les niveaux restent modérément bas et le sont également moyennés sur 3 mois.

IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit, mais c'est un des rares secteurs où elle n'est pas généralisée puisque, si 2 des 4 sources présentent des niveaux en baisse, les 2 autres ont des niveaux stables par rapport à ceux de mai.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément bas. Les 4 sources se répartissent également entre niveaux modérément bas et niveaux bas (sources du Pradet et du Gail).

Évolution IPS


La vidange est légèrement supérieure à la normale puisque, si 2 sources enregistrent une baisse d'une classe d'IPS, une autre conserve celle de mai et la source du Pradet connaît même une rare hausse d'une classe en juin.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux passent d'autour de la moyenne à modérément bas. Ils se situent entre ceux de l'année 2021 et ceux des années 2022 et 2023, tous également modérément bas. Ils étaient supérieurs ces deux dernières années : modérément hauts en 2025 et hauts en 2024.

IPS_3mois Juin



IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations déficitaires (61% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au sud du secteur (33% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux sont plus bas et en baisse à l'ouest, plus hauts et stables un peu plus à l'est.

En résumé

Les évolutions sont limitées dans ce secteur inertiel. Les niveaux restent donc modérément hauts, pour le mois de juin comme moyennés sur les 3 derniers mois.

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit, mais c'est un des rares secteurs où elle n'est pas généralisée puisque, si 2 des 4 piézomètres présentent des niveaux en baisse, les 2 autres ont des niveaux stables par rapport à ceux de mai.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément haut même si ce n'est plus la classe d'IPS que d'un seul des 4 piézomètres. Si Pouydesseaux affiche quant à lui toujours un niveau haut, Lucbardez-et-Bargues rejoint Pujo-le-Plan avec un niveau autour de la moyenne.

Évolution IPS


L'IPS n'évolue jamais brutalement dans ce secteur et c'est à nouveau vérifié en ce mois de mai puisqu'un seul changement est enregistré par rapport à mai : la baisse d'une classe d'IPS pour le piézomètre de Lucbardez-et-Bargues, exactement comme ces deux derniers mois.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément hauts, quasiment identiques à ceux de 2022. Parmi les années récentes, les niveaux étaient supérieurs en 2025 (toujours modérément hauts) et 2021 (niveaux hauts, à la limite des niveaux très hauts). Ils étaient par contre plus bas en 2024 (toujours modérément hauts) et 2023 (autour de la moyenne).

IPS_3mois Juin



IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Juin 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ● Indéterminé |

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (44% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué au nord de la Vézère (de 29 à 36% de la normale).


Sectorisation comportements

Comme ces derniers mois, le seul niveau qui se distingue véritablement des autres, et le seul restant supérieur à la moyenne, se situe au centre sud du secteur.

En résumé

Si la vidange n'est pas particulièrement supérieure à la normale dans ce secteur réactif, les niveaux passent néanmoins de modérément bas à bas. Ce secteur affiche une grande proportion (36%) des niveaux les plus bas du bassin Adour-Garonne. Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent toutefois modérément bas.

IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataignerai - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin, comme en mai.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément bas à un niveau bas. Désormais seul le piézomètre de Mansac affiche un niveau qui n'est pas inférieur à la moyenne (toujours modérément haut). Sur les 11 autres piézomètres, 4 présentent un niveau bas et 4 affichent un niveau très bas, soit plus d'un tiers (4/11) des niveaux très bas enregistrés en juin sur le bassin Adour-Garonne.

Évolution IPS


La vidange est un peu supérieure à la normale puisque la majorité (8/12) des points de suivi conservent leur classe d'IPS de mai. Toutefois, les 4 derniers piézomètres enregistrent une baisse de leur classe d'IPS, dont une baisse de 2 classes à Donzenac.

Situation en juin 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément bas, mais se rapprochent des niveaux bas. Ils sont un peu inférieurs à ceux de 2017, et seule l'année 2011 présentait des niveaux inférieurs (très bas) à cette période de l'année. Toutes les années récentes présentaient des niveaux supérieurs : modérément bas (mais proches d'autour de la moyenne) en 2022, autour de la moyenne en 2021, 2023 et 2025 et très hauts en 2024.

IPS 3mois Juin



IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Juin 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Juin 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en juin 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (51% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué sur la pointe nord du secteur (moins de 40% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux sont plus bas sont observés au centre ouest du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit, plutôt conforme à la normale mais la faible variations des niveaux les fait passer de modérément bas à bas en juin. Il en est de même pour les niveaux moyennés sur 3 mois.

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Juin 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en juin 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en juin.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément bas à bas, même si 2 des 4 piézomètres affichent toujours un niveau modérément bas. Les 2 autres affichent donc des niveaux inférieurs : bas à Maussac et très bas à Egletons.


Évolution IPS

Malgré la baisse de l'IPS moyen, la vidange est plutôt conforme à la normale pour un mois de juin puisque les 4 piézomètres conservent leur classe d'IPS de mai.


Situation en juin 2026

Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux passent également de modérément bas à bas et sont très proches des niveaux affichés en 2019. Toutes les années récentes présentent des niveaux supérieurs : modérément bas en 2021 et 2022, autour de la moyenne en 2023 et 2025 et hauts en 2024.



IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - juin 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé