

Bulletin de Situation des Nappes du bassin Adour-Garonne

État des nappes libres en septembre 2026

Date de publication : 6 octobre 2026

BRGM - Site de Toulouse
Pierre Le Cointe

Documentation

Les principes et la méthode de réalisation du Bulletin de Situation des Nappes (BSN) et du calcul des indicateurs sont présentés dans les rapports suivants :

- **Rapport BRGM RP-61807-FR** : *Établissement d'un réseau de référence piézométrique pour le suivi de l'impact du changement climatique sur les eaux souterraines (année 3) et essai de détermination d'un index piézométrique standardisé* ;
- **Rapport BRGM RP-64147-FR** : *Proposition d'un indicateur piézométrique standardisé pour le Bulletin de Situation Hydrologique "Nappes"* ;
- **Rapport BRGM RP-67249-FR** : *Note sur l'utilisation de l'IPS (Indicateur Piézométrique Standardisé) - Bulletin de Situation Hydrogéologique (BSH)* ;
- **Rapport BRGM RP-67251-FR** : *Index Piézométrique Standardisé (IPS) - Bilans et comparaisons avec l'indicateur du BSH*.

Sources des données

- **Producteurs de données** : BRGM, Parc Naturel Régional des Grandes Causses, Conseil Départemental des Landes ;
- **Origine des données** : ADES via API Hub'Eau Piézométrie, HydroPortail via API Hub'Eau Hydrométrie et SIEau ;
- **Fonds cartographiques** : AEAG - Référentiel Masses d'Eau (MESO), BRGM – BDLISA, AEAG / IGN – BD TOPAGE, IGN – Géoportail / Admin Express, OpenStreetMap.

Liste des Indicateurs Globaux (IG) par département

- Ariège : IG21
- Aude : IG21, IG52
- Aveyron : IG22, IG26, IG47, IG52
- Cantal : IG47, IG52, IG54, IG58
- Charente : IG16, IG17, IG18, IG37, IG54
- Charente-Maritime : IG16, IG17, IG18, IG19
- Corrèze : IG18, IG22, IG54, IG58
- Creuse : IG58
- Dordogne : IG17, IG18, IG22, IG37, IG54
- Gard : IG26, IG52
- Haute-Garonne : IG21, IG52
- Gers : IG20, IG21, IG53
- Gironde : IG18, IG19, IG44
- Hérault : IG26, IG52
- Landes : IG19, IG20, IG53
- Lot : IG17, IG18, IG22, IG52, IG54
- Lot-et-Garonne : IG17, IG18, IG19, IG21, IG22, IG44, IG53
- Lozère : IG26, IG47, IG52
- Puy-de-Dôme : IG47, IG58
- Pyrénées-Atlantiques : IG19, IG20
- Hautes-Pyrénées : IG20, IG21
- Deux-Sèvres : IG16, IG37
- Tarn : IG21, IG22, IG52
- Tarn-et-Garonne : IG21, IG22, IG52
- Vienne : IG37
- Haute-Vienne : IG54

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en septembre 2026

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47


IG52

IG53

IG54

IG58

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Contexte hydrologique

La période de recharge 2025-2026 a été courte, de novembre à février, mais marquée par des précipitations exceptionnelles à la fin de celle-ci. La sécheresse s'est installée depuis, avec des précipitations très déficitaires chaque mois hormis mai et août, proches de la normale. Septembre a été également très sec (25% de la normale en moyenne), avec des précipitations déficitaires sur l'ensemble du bassin (maximum de 75% de la normale en bordure sud-est, à l'est de Castres).

Sectorisation comportements

Deux tiers des secteurs aquifères présentent des niveaux bas ou modérément bas. Seuls les nappes des calcaires crétacés (Périgord-Angoumois), les karsts des Grands Causses ainsi que les alluvions de la Garonne amont et de ses affluents présentent un niveau autour de la moyenne. Aux extrémités du spectre, les niveaux restent modérément hauts sur les nappes plus inertielles de l'Armagnac mais très bas sur le socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie.

En résumé

La vidange des nappes se poursuit, plutôt conforme à la normale en septembre malgré le déficit des précipitations à nouveau constaté. Les niveaux restent majoritairement sous la moyenne, avec près de 40% de niveaux bas ou très bas. Moyennée sur 3 mois, la situation reste également inférieure à la moyenne, avec un niveau là aussi modérément bas, équivalent à celui de 2022.

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en septembre 2026

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47


IG52

IG53

IG54

IG58

BSN Adour-Garonne - Nappes libres - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange des nappes se poursuit en septembre (75% de niveaux en baisse) mais la part de niveaux stabilisés augmente (22%), à l'approche de la fin de l'étiage. Le nombre de niveaux en hausse reste limité (4 piézomètres).

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS médian reste modérément bas mais la part de niveaux inférieurs à la moyenne est à nouveau en hausse (69%, contre 60% en août), quand celle des niveaux supérieurs à la moyenne reste à nouveau assez stable (21%). Plus précisément, le mois de septembre se caractérise par :

- 4% de niveaux hauts (3 piézomètres) ou très hauts (1 source) ;
- 17% de niveaux modérément hauts ;
- 10% de niveaux autour de la moyenne ;
- 30% de niveaux modérément bas ;
- 39% de niveaux bas (19%) ou très bas (20%), un chiffre à nouveau en hausse.

Évolution IPS

La vidange est toutefois plutôt conforme à la normale en septembre puisque trois quarts (73%) des points de suivi conservent leur classe d'IPS. Les baisses (21%) sont toutefois trois fois plus nombreuses que les hausses (7%). Les variations de plus d'une classe restent limitées (1 hausse, 4 baisses).

Ensemble du bassin Adour-Garonne - Situation en septembre 2026

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53


IG54

IG58


Année de référence

Moyennés sur l'été (période juillet-septembre), les niveaux restent modérément bas, avec une situation très proche de celle de 2022. Toutefois, depuis 2010, seule l'année 2011 présentait des niveaux plus bas à cette période de l'année. Les années récentes autre que 2022 affichaient des niveaux plus élevés : toujours modérément bas en 2023, autour de la moyenne en 2025, modérément haut en 2021 et hauts en 2024. Pour les formations volcaniques (IG 47) et 2 des 3 secteurs de socle (IG 52 et 54), cette période de l'été 2026 établit de nouveaux niveaux records bas.

IPS_3mois Septembre



IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Septembre 2026



Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (39% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué sur la côte atlantique, autour de Rochefort (18% de la normale) mais moins prononcé dans la partie est du secteur (autour de 60% de la normale).

Sectorisation comportements

Le niveau le plus haut (niveau haut) est toujours observé au nord-est du secteur. Les niveaux les plus critiques (très bas) sont, quant à eux, observés plus au sud. Par rapport aux mois précédents, l'écart augmente entre les niveaux extrêmes.

En résumé

La vidange se poursuit, plutôt conforme à la normale, mais les niveaux restent bas, en septembre comme sur la moyenne des 3 derniers mois. La quasi-totalité des points de suivi affiche un niveau bas ou très bas.


Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, comme de mars à août (à une exception près en juin).

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen évolue très peu et correspond toujours à un niveau bas. Comme ces derniers mois, tous les indicateurs présentent un niveau inférieur à la moyenne à l'exception du piézomètre de Bellicou, dont le niveau devient haut. Les autres points de suivi se répartissent entre niveaux bas (3) et très bas (3 également, toujours Montigné, Lunesse et Balzac).

Évolution IPS


La vidange est plutôt conforme à la normale pour un mois de septembre. Trois piézomètres enregistrent un changement d'une classe d'IPS : une hausse pour Bellicou contre une baisse pour Saint-Fraigne et Aigre.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également bas. Depuis 1995, les niveaux n'ont été plus bas à cette période de l'année qu'en 2005 (niveaux très bas). Ces cinq dernières années, les niveaux étaient systématiquement supérieurs : bas en 2022, modérément bas en 2023, autour de la moyenne en 2025 et hauts en 2021 et 2024.

IPS_3mois Septembre




IG 16 - Calcaires Jurassique moy. et sup. Charentes - Septembre 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	○ Indéterminé

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Septembre 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (31% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué entre les vallées de l'Isle et de la Dordogne (14 à 18% de la normale) mais moins prononcé le long de l'estuaire de la Gironde (55% de la normale).


Sectorisation comportements

Globalement, les niveaux les plus bas, inférieurs à la moyenne, sont observés dans la partie centrale du secteur. A l'ouest et au sud-est, ils sont plutôt supérieurs à la moyenne.

En résumé

La vidange se poursuit, conforme à la normale. Les niveaux évoluent peu et restent autour de la moyenne, en septembre comme pour la moyenne des 3 derniers mois.

IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, pour un sixième mois consécutif.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne. Les niveaux supérieurs à la moyenne (4, tous modérément hauts) sont un peu moins nombreux que les niveaux inférieurs à la moyenne. Outre les 3 niveaux modérément bas, le niveau est toujours bas à Torsac et très bas à Bourrou.

Évolution IPS

La vidange est conforme à la normale pour un mois de septembre puisque seul un piézomètre enregistre un changement : une baisse d'une classe d'IPS à Dignac, soit l'évolution inverse de celle observée au mois d'août.

IG17 – Nappes des calcaires crétacés du Périgord et du bassin Angoumois

Bassin
Adour-
Garonne

IG16

IG17

IG18

IG19

IG20

IG21

IG22

IG26

IG37

IG44

IG47

IG52

IG53

IG54


IG58

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également autour de la moyenne, quasiment identiques à ceux de l'année 1997. Parmi les années récentes, ils étaient inférieurs en 2022 et 2023 (modérément bas) mais supérieurs en 2025 (autour de la moyenne), 2021 (modérément hauts) et, surtout, 2024 (très hauts).

IPS_3mois Septembre



IG 17 - Calcaires Crétacé sup. Périgord - Angoumois - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Septembre 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (31% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué dans vallées de l'Isle, de la Dordogne et de la Garonne (14 à 19% de la normale) mais moins prononcé le long de l'estuaire de la Gironde (jusqu'à 55% de la normale).


Sectorisation comportements

Les niveaux les plus bas sont observés dans la partie est du secteur, comme les mois précédents, mais également dans la partie centrale, où ils sont encadrés par des niveaux un peu plus hauts. La sectorisation n'est pas liée aux bassins versants des cours d'eau du secteur.

En résumé

Les niveaux restent modérément bas, en septembre comme moyennés sur 3 mois. Si la vidange est globalement conforme à la normale, le nombre de niveaux très bas repasse de 2 à 3, signe que l'amélioration constatée en août ne s'est pas poursuivie en septembre, faute de précipitations.

IG 18 - Alluvions Garonne aval et Dordogne - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, à une exception près : le niveau est en hausse à Tonneins.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément bas mais seuls 2 piézomètres affichent désormais un niveau supérieur à la moyenne (modérément haut pour les 2). Tous les autres piézomètres ont un niveau inférieur à la moyenne, dont 2 niveaux bas et 3 niveaux très bas à Allasac, Porchères et Malemort-sur-Corrèze.

Évolution IPS


La vidange est globalement conforme à la normale pour un mois de septembre puisque seuls 2 des 11 piézomètres enregistrent un changement par rapport au mois d'août. Si la baisse est d'une classe à Porchères, elle est de 3 classes à Villeteureix. Ce cas unique dans le bassin Adour-Garonne en septembre pourrait toutefois s'expliquer par un pompage dans l'ouvrage ou à proximité immédiate.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également modérément bas mais sensiblement inférieurs à ceux des années les plus proches, 2019 et 2022. Seule l'année 2011 affichait des niveaux plus bas à cette période de l'année. Parmi les autres années récentes, les niveaux étaient également modérément bas en 2023 et 2025. Ils étaient hauts en 2021 et 2024.

IPS_3mois Septembre



IG 18 - Alluvions Garonne avale et Dordogne - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Septembre 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (31% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué dans un grand tiers sud-est du secteur (16 à 20% de la normale) mais moins prononcé dans le Médoc (55 — 58% de la normale).


Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation des comportements. Le seul niveau supérieur à la moyenne reste au centre du secteur, à la limite entre Gironde et Landes.

En résumé

Si la vidange continue, contrairement aux mois précédents, elle est conforme à la normale en septembre. Le niveau moyen du mois de septembre comme celui de la période juillet-septembre, est à la limite entre modérément bas et bas. Les niveaux bas et très bas restent majoritaires.

IG 19 - Plio-Quaternaire aquitain - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, pour un quatrième mois consécutif.


Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen évolue très peu, mais cela suffit pour le faire repasser de bas à modérément bas. A l'exception du piézomètre de Belin-Beliet (toujours modérément haut), tous les niveaux restent inférieurs à la moyenne, avec 3 niveaux modérément bas, 3 niveaux bas et 2 niveaux très bas, à Lanton et Vendays-Montalivet.

Évolution IPS

La vidange a été parfaitement conforme à la normale pour un mois de septembre puisque tous les piézomètres conservent leur classe d'IPS du mois d'août.

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (22% de la normale en moyenne), un déficit encore plus marqué dans la vallée amont de l'Adour (Hautes-Pyrénées et Gers, 12 à 16% de la normale) mais moins prononcé dans la vallée amont du Gave de Pau (36% de la normale).


Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation des comportements. Les niveaux les moins bas sont observés dans la vallée amont de l'Adour, près de Tarbes, et dans les terrasses de la Midouze, près de Mont-et-Marsan.

En résumé

La vidange se poursuit et est même supérieure à la normale en septembre, les niveaux moyens passant de modérément bas à bas. Trois piézomètres affichent désormais un niveau très bas. Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent toutefois modérément bas.

IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit, puisque les niveaux restent en baisse sur la majorité des ouvrages. Toutefois, les niveaux se sont stabilisés pour 2 d'entre eux et il est même orienté à la hausse pour le piézomètre de Peyta.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément bas à bas. Si Peyta et Campet-et-Lamolère affichent toujours un niveau autour de la moyenne, tous les autres sont inférieurs, dont 3 niveaux très bas à Lafitole, Grenade-sur-l'Adour et St-Cricq-du-Gave.

Évolution IPS


Dans ce secteur, le déficit de précipitations s'est traduit par une vidange supérieure à la normale en septembre, puisque la moitié des piézomètres ont enregistré une baisse d'une (2 ouvrages) ou deux (Grenade-sur-l'Adour et St-Cricq-du-Gave) classes d'IPS.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément bas, proches de ceux des années 2005 et 2009. Toutes les années récentes affichaient toutefois des niveaux supérieurs à cette période de l'année : également modérément bas en 2022 et 2025, modérément hauts en 2021 et 2023 et hauts en 2024.

IPS_3mois Septembre




IG 20 - Alluvions Adour et Gave de Pau - Septembre 2026



Niveau des nappes			Evolution récente	
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse	■ Stable	
● Hauts	● Bas	▲ En hausse	● Indéterminé	
● Modérément hauts	● Très bas			
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes			

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Septembre 2026



Niveau des nappes				Evolution récente	
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse	■ Stable	▲ En hausse	● Indéterminé
● Hauts	● Bas				
● Modérément hauts	● Très bas				
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes				

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations extrêmement déficitaires (12% de la normale en moyenne), sur l'ensemble du secteur (précipitations entre 8 et 19% de la normale). C'est le secteur du bassin où le déficit de précipitations a été le plus prononcé en septembre.


Sectorisation comportements

Les niveaux sont plutôt inférieurs dans la partie sud, incluant les niveaux les plus bas dans les vallées amont de la Garonne et de l'Ariège. Ils sont plus élevés, et même souvent supérieurs à la moyenne, dans la partie nord.

En résumé

La vidange se poursuit, mais elle est inférieure à la normale en septembre, ces nappes plus inertielles bénéficiant des précipitations d'août. Les niveaux du mois de septembre comme ceux moyennés sur les 3 derniers mois restent tous les deux autour de la moyenne.

IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, à deux exceptions près : le niveau est stable à Montaut et Lalbarède.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste autour de la moyenne et est même quasiment égal à la moyenne, ce dont atteste la répartition des indicateurs ponctuels : 4 niveaux autour de la moyenne, 7 supérieurs (6 modérément hauts et 1 haut à Ondes) et 7 inférieurs (5 modérément bas et 2 bas, aux Bordes et à Verniolle).

Évolution IPS


Signe de l'inertie plus grande de ces nappes alluviales, elles bénéficient en septembre des pluies plutôt normales d'août alors que le mois qui s'achève a été particulièrement déficitaire. Ainsi, la vidange est un peu inférieure à la normale pour un mois de septembre, avec 4 piézomètres qui enregistrent une hausse d'une classe d'IPS, contre une seule baisse, d'une classe également, à Sauveterre-St-Denis.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également autour de la moyenne et sont quasiment identiques à ceux de l'année 2016. Parmi les années récentes, ils étaient inférieurs en 2022 (modérément bas) et 2023 (autour de la moyenne) mais plus élevés en 2021, 2024 et 2025 (modérément hauts).

IPS_3mois Septembre



IG 21 - Alluvions Garonne amont et affluents - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Septembre 2026



Niveau des nappes

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| ● Très hauts | ● Modérément bas |
| ● Hauts | ● Bas |
| ● Modérément hauts | ● Très bas |
| ● Autour de la moyenne | ○ Données insuffisantes |

Evolution récente

- | |
|---------------|
| ▼ En baisse |
| ■ Stable |
| ▲ En hausse |
| ○ Indéterminé |

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (27% de la normale en moyenne), un déficit un peu plus marqué entre les vallées du Lot et de la Dordogne (19 à 23% de la normale) mais moins prononcé au nord de la Dordogne (31 à 41% de la normale).


Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation des comportements : le niveau le plus haut (modérément haut) et le niveau le plus bas (bas) sont observés sur les deux ouvrages situés au nord de la Dordogne.

En résumé

Les niveaux des sources, à l'étiage, ne baissent plus que ponctuellement. Toutefois, la sécheresse se fait ressentir même si les restent modérément bas pour un mois de septembre, comme moyennés sur la période juillet-septembre.

IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

Malgré le déficit de précipitations de septembre, les niveaux restent majoritairement stables. Il faut dire que la plupart de ces sources sont déjà à leur niveau d'étiage depuis juillet. Deux exceptions sont toutefois mesurées, avec des niveaux en baisse pour le piézomètre de Chaufour-sur-Vell et l'Ouyse à la perte de Thémènes.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen reste modérément bas, tout comme 5 des 8 ouvrages suivis. Il est autour de la moyenne pour la source du Blagour de Souillac et bas pour celle de la Diège ainsi que le piézomètre de Chaufour-sur-Vell.

Évolution IPS


Malgré la stabilité des niveaux, l'impact de la sécheresse s'observe sur l'évolution de l'IPS : il est en baisse pour 5 ouvrages, dont une baisse de 2 classes pour la source de la Diège. Seule évolution opposée, la hausse de 2 classes pour la source du Candé, au plus bas il y a un mois.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux redeviennent modérément bas et sont quasiment identiques à ceux de l'année 2011, seule l'année 2019 ayant présenté des niveaux inférieurs (niveaux bas). Toutes les années récentes affichaient donc des niveaux plus élevés : modérément bas également en 2022 et 2023, autour de la moyenne en 2025, hauts en 2024 et très hauts en 2021.

IPS_3mois Septembre




IG 22 - Causses du Quercy et bordures - Septembre 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	○ Indéterminé

IG 26 - Grands Causses - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (29% de la normale en moyenne), un déficit plus marqué à l'ouest et au sud-ouest du secteur, de Rodez à Millau (12 à 16% de la normale) mais moins prononcé au centre est, dans la partie lozérienne du secteur (45 de la normale, localement 55 à 62%).

Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation des niveaux : les niveaux les plus bas, mais aussi le niveau le plus haut, sont observés dans la partie nord du secteur.

En résumé


Les niveaux des sources, à l'été, ne baissent plus que ponctuellement. Globalement, les niveaux sont autour de la moyenne, aussi bien pour le mois de septembre que pour la période juillet-septembre.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent autour de la moyenne, quasiment identiques à ceux de l'an dernier, mais aussi à ceux de 2007 et 2021. Parmi les autres années récentes, ils étaient inférieurs en 2022 (niveaux bas) et 2023 (modérément bas) mais plus élevés en 2024 (modérément hauts).

IPS_3mois Septembre




IG 26 - Grands Causses - Septembre 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé

IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Septembre 2026



Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations fortement déficitaires (43% de la normale en moyenne), un déficit plus marqué au sud du secteur, dans le département de la Dordogne (14 à 25% de la normale) mais moins prononcé au nord du secteur (52 à 61% de la normale).

Sectorisation comportements

Dans un secteur plutôt homogène, le niveau le plus haut, et une nouvelle fois le seul qui n'est pas inférieur à la moyenne, se situe au nord du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit, conforme à la normale. Les niveaux évoluent peu et restent modérément bas, en septembre comme pour la moyenne des 3 derniers mois.


Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, pour un sixième mois consécutif.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen ne varie pas et reste modérément bas, comme le niveau affiché par 4 des 7 piézomètres. Il est inférieur à Sauzé-Vaussais et St-Projet (niveaux bas), mais supérieur à Blanzay (modérément haut).

Évolution IPS


La vidange est conforme à la normale pour un mois de septembre puisque seul un piézomètre enregistre un changement : une baisse d'une classe d'IPS à Ruffec, soit l'évolution inverse de celle observée au mois d'août.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent modérément bas, très proches de ceux de 1993 et 2017. Parmi les années récentes, ils étaient inférieurs en 2022 (niveau bas) et 2023 (modérément bas également), mais supérieurs en 2025 (autour de la moyenne), 2021 (modérément haut) et 2024 (très haut).

IPS_3mois Septembre



IG 37 - Karst de la Rochefoucauld et Jurassique Poitou - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (26% de la normale en moyenne), un déficit plus marqué à l'extrémité sud-est du secteur (15% de la normale) mais moins prononcé dans la partie médocaine du secteur (55% de la normale).


Sectorisation comportements

Secteur au nombre de points de suivi limité, avec des comportements différents en septembre.

En résumé

Les évolutions restent limitées dans ce secteur plus inertiel mais la vidange se poursuit et les niveaux deviennent modérément bas en septembre alors qu'ils restent autour de la moyenne sur la période juillet-septembre. Dans les deux cas, les niveaux se trouvent toutefois proches de la limite entre les 2 classes.

IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque les niveaux sont en baisse sur les deux points de suivi présentant des données pour le mois de septembre, comme ces derniers mois.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen devient modérément bas, même s'il évolue peu et reste proche d'un niveau autour de la moyenne. Cela correspond aux classes d'IPS de chacun des deux piézomètres : autour de la moyenne à St-Médard-d'Eyrans, modérément bas au Taillan-Médoc.

Évolution IPS


La vidange est conforme à la normale puisque les 2 piézomètres conservent leur classe d'IPS du mois d'août.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent autour de la moyenne, mais se rapprochent des niveaux modérément bas. L'année 2025, autour de la moyenne également, est la plus proche mais avec un niveau nettement supérieur toutefois. Parmi les autres années récentes, les niveaux étaient inférieurs en 2022 et 2023 (modérément bas) mais plus élevés en 2021 et 2024 (niveau haut).

IPS_3mois Septembre




IG 44 - Calcaires oligocènes de l'Entre-deux-Mers - Septembre 2026



Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	○ Indéterminé

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (16% de la normale en moyenne), sur la quasi-totalité du secteur, avec un déficit un peu moins prononcé à l'extrémité nord du secteur (30% de la normale).


Sectorisation comportements

Secteur au nombre de points de suivi limité, avec des comportements différents en septembre.

En résumé

Dans ce secteur réactif au suivi limité, l'évolution d'un des deux points suffit à faire passer les niveaux moyens de modérément bas à bas. Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également bas. A Espinhal, le niveau reste très bas depuis 6 mois.

IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

Évolutions différentes pour les 2 points de suivi : le niveau est en baisse à Espinhal et stable à Moussages, deux évolutions différentes de celles observées au mois d'août dans ce secteur réactif.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen passe de modérément bas à bas, sous l'influence du piézomètre de Moussages, dont le niveau passe d'autour de la moyenne à modérément bas. Par contre, il reste très bas à Espinhal.

Évolution IPS


Le déficit de précipitations de septembre s'observe dans l'évolution de l'IPS à Moussages (-1 classe), quand il reste stable (mais très bas) à Espinhal.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent bas et constituent un nouveau record pour la période estivale juillet-septembre. Seule l'année 2009 a présenté également un niveau bas, mais un peu supérieur, à cette période de l'année. Toutes les années récentes présentaient donc des niveaux supérieurs : modérément bas en 2025, autour de la moyenne en 2022 et 2023, modérément hauts en 2024 et très hauts en 2021.

IPS_3mois Septembre



IG 47 - Formations volcaniques du Massif Central - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (22% de la normale en moyenne), comprises entre 15 et 30% de la normale sur une grande partie du territoire. A signaler le contraste important dans le sud du secteur entre la Montagne Noire (10% de la normale) et la partie héraultaise (76% de la normale). Autre secteur au déficit moins prononcé à l'est de Florac-Trois-Rivières (62 à 67% de la normale).


Sectorisation comportements

Pas de sectorisation des comportements, avec un nombre de points de suivi limité mais un comportement plutôt homogène en septembre.

En résumé

Les niveaux stables sont le signe d'un étiage atteint, mais avec des niveaux critiques. En effet, le niveau moyen de septembre reste bas, tout comme celui moyenné sur la période juillet-septembre. Toutefois, dans ce cas, l'été 2026 établit un nouveau record de niveaux bas, désormais nettement inférieurs à ceux de 2022.

IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

Les niveaux de ces sources, à l'étiage, s'étaient déjà largement stabilisés ces derniers mois. C'est les cas pour les 4 sources suivies en septembre.

Indice Piézométrique Standardisé

Après correction de certaines données, l'IPS moyen évolue peu et reste bas. C'est également le niveau affiché par 3 des 4 sources suivies. La seule exception est la source 2 du Gail, dont le niveau est modérément bas.

Évolution IPS


Les niveaux d'étiage stables sont plutôt conformes à la normale pour un mois de septembre puisque 2 sources conservent leur classe d'IPS du mois d'août et que les 2 évolutions se compensent : +1 classe pour la source de St-Gal, -1 classe pour celle de Céras.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent bas. Ils sont les seuls dans cette catégorie et constituent encore une fois un nouveau record bas pour cette période de l'année depuis que le suivi est suffisant, soit depuis 2009. Ils étaient donc supérieurs lors de toutes les années récentes : modérément bas en 2022, 2023 et 2025, autour de la moyenne en 2021 et modérément hauts en 2024.

IPS_3mois Septembre




IG 52 - Socle Cévennes - Margeride - Ségala - Montagne noire - Septembre 2026



Niveau des nappes		Evolution récente	
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse	
● Hauts	● Bas	■ Stable	
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse	
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé	

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (21% de la normale en moyenne), sur l'ensemble du secteur (précipitations entre 16 et 27% de la normale)..


Sectorisation comportements

Pas de véritable sectorisation mais le niveau le plus bas correspond toujours au piézomètre le plus au sud du secteur.

En résumé

Les évolutions sont limitées dans ce secteur inertiel. Les niveaux restent donc modérément hauts, pour le mois de septembre comme moyennés sur les 3 derniers mois. C'est désormais le seul secteur du bassin Adour-Garonne à afficher des niveaux moyens supérieurs à la moyenne.

IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

Une évolution contrastée est observée en septembre : la vidange se poursuit à Pouydesseaux et Villeneuve-de-Marsan, le niveau est stable à Pujo-Le-Plan et en hausse à Lucbardez-et-Bargues.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen n'évolue quasiment pas et reste modérément haut, comme le niveau affiché par 2 des 4 piézomètres. Il est supérieur à Pouydesseaux (niveau haut) et inférieur à Pujo-le-Plan (autour de la moyenne).

Évolution IPS


L'évolution des niveaux est parfaitement conforme à la normale pour un mois de septembre dans ce secteur inertiel, où les 4 piézomètres conservent leur classe d'IPS du mois d'août.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent également modérément hauts, un peu supérieurs à ceux des années 2000, 2002, 2014 et 2022. Ils étaient un peu plus élevés, mais également modérément hauts, en 2024 et 2025. En 2021, ils étaient à la limite entre niveaux hauts et très hauts. Par contre, ils étaient inférieurs en 2023 (autour de la moyenne).

IPS_3mois Septembre



IG 53 - Sables fauves et calcaires miocènes de l'Armagnac - Septembre 2026




Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	■ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé

La vidange se poursuit, légèrement supérieure à la normale. L'IPS moyen reste très bas, comme le niveau de 9 des 12 points de suivi. Surtout, moyennés sur 3 mois, l'été 2026 continue d'établir un nouveau record de niveaux très bas, désormais nettement inférieurs à ceux de 2011.

Niveau des nappes		Evolution récente
● Très hauts	● Modérément bas	▼ En baisse
● Hauts	● Bas	▣ Stable
● Modérément hauts	● Très bas	▲ En hausse
● Autour de la moyenne	○ Données insuffisantes	● Indéterminé

IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, à une exception près : le niveau s'est stabilisé sur le piézomètre de Champniers-et-Reilhac.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen continue de baisser un peu et affiche donc toujours un niveau très bas. 9 des 12 piézomètres affichent également ce niveau très bas, 2 de plus qu'en août, un chiffre qui ne fait que croître depuis l'apparition des premiers niveaux très bas en mai. Les 3 derniers piézomètres affichent des niveaux différents : bas à Roannes-St-Mary, mais toujours modérément bas à Champniers-et-Reilhac et modérément haut à Mansac.

Évolution IPS


La vidange est légèrement plus rapide que la normale. En effet, si 10 des 12 piézomètres conservent leur classe d'IPS du mois d'août, les 2 derniers (La Meyze et Lagleygeolle) enregistrent une baisse d'une classe, faisant passer leur niveau de bas à très bas.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux deviennent très bas. Ils constituent un nouveau record bas pour cette période de l'année depuis que le suivi est suffisant, soit depuis 2007, et sont nettement inférieurs à ceux de 2011, qui constituait le précédent record, avec des niveaux qualifiés aujourd'hui de modérément bas uniquement. Ils étaient donc supérieurs lors de toutes les années récentes : modérément bas en 2022 et 2025, autour de la moyenne en 2023 et hauts en 2021 et 2024.

IPS_3mois Septembre



IG 54 - Socle du plateau du Limousin et de la Chataigneraie - Septembre 2026




Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé

Situation en septembre 2026

Contexte hydrologique

Précipitations très fortement déficitaires (30% de la normale en moyenne), un déficit plus marqué à l'extrémité sud-est du secteur (12 à 15% de la normale) mais moins prononcé à l'extrémité nord du secteur (42% de la normale).


Sectorisation comportements

Le niveau le plus bas est toujours observé en limite ouest du secteur.

En résumé

La vidange se poursuit, plutôt conforme à la normale. Les niveaux restent donc bas et le niveau reste très bas pour le piézomètre d'Egletons. Moyennés sur 3 mois, les niveaux sont également bas mais ne constituent plus un record pour l'été 2026. En effet, ils étaient encore plus bas (très bas) en 2019 à cette période de l'année.

IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Septembre 2026
Histogrammes des évolutions depuis un an des points de suivi BSN



Situation en septembre 2026

Évolution niveaux moyens mensuels

La vidange se poursuit puisque tous les niveaux sont en baisse en septembre, comme lors des 7 derniers mois, à 2 exceptions près, un niveau stable en mai et un en août.

Indice Piézométrique Standardisé

L'IPS moyen affiche toujours un niveau bas. Deux des 4 piézomètres affichent toujours un niveau modérément bas, quand il est bas à Chalignac et reste très bas à Egletons.

Évolution IPS


La vidange a été plutôt conforme à la normale pour un mois de septembre puisqu'une seule évolution est mesurée : la baisse d'une classe sur le piézomètre de Chalignac.

Situation en septembre 2026


Année de référence

Moyennés sur 3 mois, les niveaux restent bas, comme ceux de 2020 qui étaient toutefois un peu supérieurs. Ils ne constituent toutefois pas un record sur la période estivale juillet-septembre puisque les niveaux étaient très bas en 2019. Par contre, ils étaient plus élevés pour toutes les années récentes : modérément bas en 2022 et 2023, autour de la moyenne en 2025 et hauts en 2021 et 2024.

IPS_3mois Septembre



IG 58 - Socle de la Combraille et du plateau de Millevaches - Septembre 2026



Niveau des nappes

- Très hauts
- Hauts
- Modérément hauts
- Autour de la moyenne
- Modérément bas
- Bas
- Très bas
- Données insuffisantes

Evolution récente

- ▼ En baisse
- Stable
- ▲ En hausse
- Indéterminé