
Géosciences pour une Terre durable brgm	Bulletin de situation piézométrique	BRGM Pays de la Loire 1 rue des Saumonières - BP 92342 44323 Nantes Cedex 3
Département : Mayenne (53)	**Date :** 1er novembre 2026	

Le réseau de suivi piézométrique du département de la Mayenne a été mis en place par le BRGM à partir de 2003. Ce réseau comporte 12 stations de suivi piézométrique réparties de manière à suivre les aquifères majeurs à l'échelle départementale (schistes, grès armoricains, granite, calcaires du Paléozoïque, sables rouges du Pliocène).

Pour en savoir plus sur les réseaux de surveillance piézométrique en Pays de la Loire

Situation piézométrique au 1er novembre 2026



En Mayenne, les nappes sont majoritairement très réactives.

Depuis septembre 2025, seules les pluies des mois de janvier puis de février 2026 ont permis une recharge des nappes en Mayenne. La vidange saisonnière a ensuite débuté précocement à partir de mars. Depuis, malgré quelques épisodes pluvieux ponctuels, le déficit pluviométrique et l'assèchement des sols liés aux épisodes caniculaires successifs ont accentué la vidange des nappes sur l'ensemble du territoire. **Depuis la fin de l'été, malgré quelques épisodes pluvieux**, **la situation des ressources continue de se dégrader.**

Au 1er novembre, la vidange saisonnière des aquifères se poursuit sur presque l'ensemble des piézomètres. L'état des ressources en eaux souterraines continue à être plus défavorable en particulier dans la moitié sud du département. Sur les 12 suivis piézométriques actifs dans le département :

- Tendance : Sur les 12 piézomètres suivis seulement 3 amorcent un début de hausse alors que leurs niveaux sont très bas à modérément bas. Pour les autres piézomètres, les niveaux enregistrés poursuivent leur baisse.
- Situation : les 3/4 des piézomètres enregistrent des niveaux inférieurs aux moyennes, modérément bas à très bas (nappe des calcaires carbonifères à Saint-Pierre-sur-Erve, Ballots et Grez-en-Bouère dans le socle et la nappe des calcaires cambriens à Saint Christophe du Luat). Parmi eux, plus de la moitié des piézomètres enregistrent des niveaux en dessous des minimums connus pour la saison.

Le prochain bulletin sera diffusé au 1er janvier 2027



Géosciences pour une Terre durable
brgm

Chroniques piézométriques actualisées

Aquifère	Identifiant BSS *ancien identifiant*	Commune	Chronique Piézométrique	Statistiques
Pliocène (sables rouges)	BSS001BNZN *03904X0064/PZ*	BAZOUGES	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires cambriens	BSS000XWPS *03207X0603/PZ7*	SAINT CHRISTOPHE	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires cambriens	BSS000XWUY *03212X0021/P*	SAINT PIERRE SUR ORTHE	Accès au graphique	Accès au graphique
Calcaires carbonifères	BSS000ZSRK *03564X0063/PZ*	SAINT PIERRE SUR ERVE	Accès au graphique	Accès au graphique
Grès armoricains	BSS000TSMN *02507X0615/PZ6*	PRE EN PAIL	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZSAN *03555X6010/PZ1*	BALLOTS	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000XVZY *03201X6016/PZ2*	COMMER	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000VVVQ *02846X6018/PZ3*	ERNEE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZSXQ *03567X0041/PZ4*	GREZ EN BOUERE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000XUUY *03195X0513/PZ*	LA GRAVELLE	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000ZRTK *03554X0029/PZ5*	LAVAL	Accès au graphique	Accès au graphique
Socle	BSS000VWGX *02854X0024/PZ6*	LE HORPS	Accès au graphique	Accès au graphique